

Eine Untersuchung  
der  
**Parallaxe des Zentralsternes des Ringnebels**  
in der Leier.

Messier 57. — Dreyer's General Catalogue 6720.

---

Der philosophischen Facultät  
der  
K. Ludwig-Maximilians-Universität in München  
als  
**Inaugural-Dissertation**

vorgelegt am 8. Februar 1902

von

**Burt L. Newkirk**  
aus Minneapolis.

---

**München 1902.**

Druck der Akademischen Buchdruckerei von F. Straub.



Eine Untersuchung  
der  
**Parallaxe des Zentralsternes des Ringnebels**  
in der Leier.

Messier 57. — Dreyer's General Catalogue 6720.

---

Der philosophischen Facultät  
der  
K. Ludwig-Maximilians-Universität in München  
als  
**Inaugural-Dissertation**

vorgelegt am 8. Februar 1902

von

**Burt L. Newkirk**  
aus Minneapolis.



---

München 1902.

Druck der Akademischen Buchdruckerei von F. Straub.



Digitized by the Internet Archive  
in 2026

Folgende Untersuchung der Parallaxe des Centralsternes des Ringnebels in der Leier beruht auf der Ausmessung von 15 photographischen Aufnahmen mit dem  $10\frac{1}{2}$  zölligen Refractor der Sternwarte der Universität von Minnesota (Vereinigten Staaten von Amerika). Einzelheiten über die Aufnahmen befinden sich in Tafel I.

Das Bild des Zentralsternes ist auf allen Platten leicht sichtbar und ist nicht von dem irgend eines anderen schwachen Sterns zu unterscheiden.

Es wurden 16 Vergleichsterne, in 8 Paaren verteilt, benützt. Die Positionen dieser Sterne findet man, nebst ihrer Helligkeit, mit hinreichender Genauigkeit für Identificationszwecke in Tafel II. Die Helligkeitsschätzungen sind mir von Prof. Leavenworth (Prof. of Astronomy and Director of the Observatory at the University of Minnesota) freundlicher Weise mitgeteilt worden. Es ist zu bemerken, dass die beiden Sterne jedes Paares in Beziehung auf Distanz vom Nebelstern, Positionswinkel und Helligkeit symmetrisch gewählt worden sind.

Alle Platten ausser No. 121 und No. 122 wurden von mir mit dem Repsold'schen Messapparat der Sternwarte der Universität von Minnesota ausgemessen. (Betreffs Beschreibung eines solchen Instrumentes siehe Scheiner's „Photographie der Gestirne“. Leipzig 1897 p. 148.) Die Platten 121 und 122 wurden von Herrn Libby, damals Assistent an der Sternwarte der Universität von Minnesota, ausgemessen und diese Messungen wurden mir von Prof. Leavenworth mitgeteilt.

Die Methode der Ausmessung war folgende: Die Platte wurde so in den Apparat eingelegt, dass der Nebelstern dem Rotationszentrum des Plattenträgers möglichst nahe stand; so dass bei einer

Umdrehung der Platte der Nebelstern einen möglichst kleinen Kreis beschrieb. Die Platte wurde dann gedreht, bis die Verbindungslinie Stern 1 — Nebelstern parallel der Verschiebungsrichtung des Mikrometerträgers war. Diese Distanz wurde dann in der gewöhnlichen Weise gemessen, wozu vier Einstellungen auf jeden Stern, und für jeden Stern je zwei Einstellungen auf zwei Scalalinen gemacht wurden. Der Plattenträger wurde dann ein wenig gedreht, bis die Linie Stern 2 — Nebelstern der Verschiebungsrichtung des Mikrometerträgers parallel war und diese Distanz in derselben Weise gemessen. Die Platte wurde dann sofort um  $180^\circ$  gedreht und dieselben Distanzen wurden in der umgekehrten Ordnung wieder gemessen. Diese Messungen galten als eine vollkommene Beobachtung eines Paares und wurden, mit sehr wenigen Ausnahmen, ohne Unterbrechung gemacht. Jede Platte, ausser No. 121 und No. 122 wurde in der beschriebenen Weise zweimal gemessen (diese beiden nur einmal), also jede einzelne Strecke im ganzen viermal.

Legt man die Platte jedesmal so in den Apparat, dass der Nebelstern dem Drehzentrum möglichst nahe liegt, so erreicht man, dass jede Strecke (z. B. Stern 1 — Nebelstern) auf allen Platten ungefähr mit demselben Teil der Scala gemessen wird; und da die Teilungsfehler in ziemlich regelmässiger Weise von den beiden Enden der Scala zu einem Maximum in der Mitte derselben ansteigen, so wird die Genauigkeit der Parallaxebestimmung von der Bestimmung der Teilungsfehler der Scala weniger abhängig gemacht, während die Messung in den zwei Positionen ( $0^\circ$  und  $180^\circ$ ) den constanten persönlichen Fehler der Einstellung eliminiert. Ferner wurde bei jeder Platte die Einstellung auf den Stern so gemacht, dass die Mikrometerablesung bei der ersten Messung  $11.0 +$ , bei der zweiten Messung dagegen  $11.5 +$  war, wodurch der Fehler wegen der Excentricität des Mikrometerkopfes im Mittel der zwei Messungen nahezu eliminiert erscheint. Bei den einzelnen Einstellungen wurde der Mikrometer bis auf zweitausendstel eines Scalateiles abgelesen und bei der Reduction wurde noch eine Decimalstelle beibehalten. Der Bogenwert eines Scalateils ist etwa  $59''.6$ . Also entspricht einer Einheit der letzten Decimalstelle der Rechnung, d. h. der vierten,  $0''.006$ . Die Positionswinkel wurden bloss auf einer Platte gemessen, um

die nötigen Data für die Beschreibung der Vergleichsterne und die Berechnung der Refraction zu gewinnen. Die Orientierung wurde mit Hilfe einer Spur erreicht. Während der Messung wurde der Temperaturzustand des Zimmers möglichst constant gehalten und nach einem raschen Temperaturwechsel keine Messungen gemacht.

Zuerst wurden die Correctionen wegen der Fehler des Messapparats angebracht. Letztere sind Teilungsfehler der Scala, Gang der Schraube und Excentrizität des Mikrometerkopfes. Die ersten genannten Correctionen wurden aus einer Tafel entnommen, die, nach einer früheren besonderen Untersuchung der Scala, von Prof. Leavenworth hergestellt worden war.

Die Correction wegen des Ganges der Schraube wurde für jeden Beobachtungstag bestimmt. Es wurde bei der Beobachtung jedes Sternes, auf die beiden Scalaliniën, zwischen welchen der Stern sich befand, eingestellt und aus 20 solchen Beobachtungen der Gang der Schraube, mit Berücksichtigung der Teilungsfehler der beiden Scalaliniën, für jeden Tag bestimmt.

Die Excentrizität des Mikrometerkopfes ist beträchtlich und verlangt eine Correction, die bis auf 0,09 steigt. Diese Excentrizität wurde, nebst einer Tafel zur bequemen Bestimmung der deshalb nötigen Correctionen, von Prof. Leavenworth, aus einer Reihe besonderer Beobachtungen berechnet.

Ein Punkt, in dem die Beobachtungs- und Reductions-Methode von der gewöhnlichen ein wenig abweicht, verdient vielleicht erwähnt zu werden. Nach der gewöhnlichen Methode, zur Messung einer Distanz zwischen zwei Punkten  $a$  und  $b$ , dreht man die Platte erst so, dass die Linie  $a-b$  parallel mit der Verschiebungsrichtung des Mikrometerträgers wird, stellt die Fäden auf den Punkt  $a$  ein, und liest dann das Mikrometer ab, hierauf wendet man das Mikroskop auf die Scala, stellt auf die nächst niedrige Scalalinie ein und liest abermals das Mikrometer ab. Die Position des Punktes  $a$  auf der Scala ist dann durch die auf der Scala abgelesene ganze Zahl und jenen Bruchteil, welcher der Differenz der Mikrometerablesungen entspricht, gegeben. Die Position des Punktes  $b$  auf der Scala ist in derselben Weise zu bestimmen. Die Correction wegen des Teilungsfehlers der Scala ist dann jedesmal diejenige, welche dem nächst niedrigeren Teilstrich

entspricht, während die Correction wegen des Ganges der Schraube für die Differenz zwischen den beiden Ablesungen zu berechnen ist. Bei diesen Messungen wurden Einstellungen auf beide Scalalinien, zwischen welchen sich die Sternposition befindet, und zwar auf jede Linie zwei, gemacht. Für die „Mikrometer-Able-  
sung der Scalalinie“ wurde die Revolutionszahl, welche zu dem niedrigeren Teilstrich gehört, für den Bruchteil aber das arithmetische Mittel der Bruchteile aller vier Ablesungen genommen. Die Correction wegen Teilungsfehler ist also das arithmetische Mittel derjenigen, welche für die obere und die untere Scalalinie gelten. Die Correction wegen des Schraubenganges ist von der Mittelstelle aus positiv oder negativ zu nehmen und kann nicht mehr als die Hälfte des Ganges für einen Millimeter betragen. Die so von den Fehlern des Messapparates befreiten Distanzen findet man in Tafel III.

Sodann wurden Correctionen wegen Tangentialdistorsion, Refraction und Aberration eingeführt. Die erste verschwindet für alle Sterne ausser No. 1 und No. 2. Die Refraction wurde nach der gewöhnlichen photographischen Differentialrefractionsformel:

$$\sigma - s = \frac{6}{65} k [\tan^2 \zeta \cos^2 (p - q) + 1]$$

berechnet, welche für diese kleinen Distanzen und bei so geringen Zenitdistanzen ausreicht. Die Refraction wurde für vier verschiedene Positionswinkel auf fünf Platten (40, 42, 100, 114, 119) berechnet. Allein für Platte 40 wurde der Wert  $\log k = 6.444$  (welche für Platte 42 gilt) und für Platte 119 der Wert  $\log k = 6.451$  (welche für Platte 114 gilt) gebraucht. Hieraus bildete man eine Tafel aus der durch Interpolation für die verschiedenen Zenitdistanzen und durch Multiplication mit einem Faktor  $\frac{k'}{k}$ , die Refractions correctionen für alle Distanzen auf allen Platten zu berechnen sind (siehe Tafel IV).

Die Verbesserung wegen Aberration wurde nach der Formel: (Scheiner's „Photographie der Gestirne“ p. 186)

$$\begin{aligned} \Delta s &= -s \sin 1'' (a A + b B) \text{ wo: } A = -20''.4451 \cos \omega \cos \odot \\ B &= -20.4451 \sin \odot \\ a &= -(\sin \alpha \cos \delta + \sin \delta \tan \epsilon) \\ b &= \cos \alpha \cos \delta \end{aligned}$$

bestimmt. Die Grösse  $\frac{\Delta s}{s}$  wurde für jede Platte berechnet (siehe Tafel V). Die Distanzen nach Einführung dieser Correctionen findet man in Tafel VI.

Es bleibt weiter, um das Material homogen zu machen — d. h. um alle Platten auf eine massgebende zu reduzieren — die Verschiedenheit des Scalawertes zu berücksichtigen, sowie die Neigung der Plattennormale gegen die optische Achse des Fernrohrs. Eine strenge Methode wäre hierzu folgende:

Construieren wir ein Coordinatensystem mit dem Anfangspunkt im Linsenzentrum und der  $z$  Achse in der optischen Achse des Fernrohrs. Sei die Ebene I senkrecht zu der  $z$  Achse in einer Entfernung  $C$  vom Nullpunkt, die Ebene II schief gegen die  $z$  Achse und in der Entfernung  $C'$  vom Nullpunkt. Sei ferner  $xyz$  ein Punkt auf der Ebene I und  $x'y'z'$  der Schnittpunkt einer durch den Anfangspunkt und den Punkt  $xyz$  gelegten Geraden mit der Ebene II. Bezeichnen wir mit  $\Delta$  und  $\Delta'$  die Entfernungen, in der Ebene I bzw. II gemessen, der Punkte  $xyz$  und  $x'y'z'$  von der  $z$  Achse. Die Aufgabe ist, die Relation zwischen  $\Delta$  und  $\Delta'$  zu bestimmen.

Es ist:

$$\frac{x}{x'} = \frac{y}{y'} = \frac{z}{z'}$$

und da  $z = C$

$$x = C \frac{x'}{z'} \quad y = C \frac{y'}{z'} \quad z = C \frac{z'}{z'}. \quad (1)$$

Sei die Gleichung der Ebene II:

$$x \cos \alpha + y \cos \beta + z \cos \gamma = \delta'. \quad (2)$$

Legen wir ein zweites Coordinatensystem mit dem Anfangspunkt im Schnittpunkte der  $z$  Achse mit der Ebene II. Sei die  $\xi$  Achse die Schnittlinie der  $xz$  Ebene mit der Ebene II und die  $\eta$  Achse sei in der Ebene II senkrecht zu ihr. Dann ist:

$$\begin{aligned} x &= \xi \cos(\xi x) + \eta \cos(\eta x) + \zeta \cos(\zeta x) \\ y &= \xi \cos(\xi y) + \eta \cos(\eta y) + \zeta \cos(\zeta y) \\ z &= C' + \xi \cos(\xi z) + \eta \cos(\eta z) + \zeta \cos(\zeta z). \end{aligned}$$

In Gleichung (2) setze man  $y = 0$ , so erhält man die Gleichung der Schnittlinie der  $xz$  Ebene mit Ebene II:

$$x \cos \alpha + z \cos \gamma = \delta'.$$

Die Gleichung dieser Linie ist aber auch:

$$x = \cot \mu (z - C')$$

oder

(3)

$$x \sin \mu - z \cos \mu = -C' \cos \mu,$$

wo  $\mu$  den Winkel bezeichnet, welchen die genannte Linie mit der nach oben gerichteten  $x$  Achse bildet.

Es ist also:

$$\sin \mu = M \cos \alpha$$

$$\cos \mu = -M \cos \gamma$$

$$\cos \mu = -M \frac{\delta'}{C'},$$

dabei:

$$\frac{\delta'}{C' \cos \gamma} = 1$$

$$M^2 (\cos^2 \alpha + \cos^2 \gamma) = M^2 \sin^2 \beta = 1 \quad M = -\frac{1}{\sin \beta}.$$

und also:

$$\sin \mu = -\frac{\cos \alpha}{\sin \beta} \quad \cos \mu = \frac{\cos \gamma}{\sin \beta}.$$

Wir denken uns nämlich die Linie  $(\alpha \beta \gamma)$  in dem ersten Octant gelegen, so dass  $\cos \gamma$  positiv ist; die Linie (3) geht nach oben — d. h.  $\cos \mu$  muss positiv sein.

Die Coordinatentransformation liefert:

$$\cos (\xi x) = \cos \mu = \frac{\cos \gamma}{\sin \beta}$$

$$\cos (\xi y) = 0$$

$$\cos (\xi z) = \sin \mu = -\frac{\cos \alpha}{\sin \beta}$$

$$\cos (\eta x) = \sin \mu \cos \sigma = -\frac{\cos \alpha \cos \beta}{\sin \beta}$$

$$\cos (\eta y) = \sin \beta$$

$$\cos (\eta z) = -\cos \mu \cos \alpha = -\frac{\cos \gamma \cos \beta}{\sin \beta}$$

$$\cos (\zeta x) = \cos \alpha$$

$$\cos (\zeta y) = \cos \beta$$

$$\cos (\zeta z) = \cos \gamma.$$



wobei  $i$  den Winkel, welchen die Normale der Ebene II (d. h. die gemessene Platte) mit der  $z$  Achse (die optische Achse des Fernrohrs) bildet ( $= \gamma$ ) ist und  $p$  den Positionswinkel der gemessenen Linie  $A'$  bezeichnet. Es ist dabei festgesetzt, dass die  $xz$  Ebene, deren Schnittlinien mit den Ebenen I und II bis jetzt willkürlich waren, diese Ebenen im Meridian schneidet.

Dann ist:

$$f = \frac{A'}{\sin \beta} [\sin i \cos \psi \cos p + \sin i \cos i \sin \psi \sin p]$$

$$\frac{1}{\sin \beta} = (1 - \sin^2 i \sin^2 \psi)^{-\frac{1}{2}} = 1 + \frac{1}{2} \sin^2 i \sin^2 \psi + \dots$$

und wenn  $\frac{i^2}{2}$  gegen 1 und  $\frac{i^3}{3!}$  gegen  $i$  vernachlässigt wird:

$$f = A' \sin i \cos (p - \psi)$$

$$A^2 = \frac{C^2 A'^2}{C'^2} \left\{ 1 - \frac{A'}{C'} \sin i \cos (p - \psi) \right\}^{-2}$$

$$A = \frac{C}{C'} A' \left\{ 1 + \frac{A'}{C'} \sin i \cos (p - \psi) \dots \right\} \quad (4)$$

oder

$$A = A' + \frac{C - C'}{C'} A' + \frac{C}{C'^2} A'^2 \sin i \cos (p - \psi).$$

Hier sind  $A'$  und  $p$  gemessen,  $C$  ist willkürlich anzunehmen und  $A, C', i$  und  $\psi$  sind unbekannt. Man hat also die Bedingungen von der Form:

$$x + A' y + (A'^2 \cos p) z + (A'^2 \sin p) w + a \pi + t \varepsilon + A' = 0,$$

wo

$$x = -A \qquad w = \frac{C}{C'^2} \sin i \sin \psi$$

$$y = \frac{C - C'}{C'} \qquad \pi = \text{die Parallaxe}$$

$$z = \frac{C}{C'^2} \sin i \cos \psi \qquad \varepsilon = \text{Änderung der Distanz wegen Eigenbewegung.}$$

Jede gemessene Distanz liefert eine solche Gleichung und es wäre möglich, diese sechs Constanten für jede Platte aus den

16 gemessenen Distanzen zu bestimmen. Die so gefundenen Verbesserungen erlauben, alle Platten auf eine fingierte zu reduzieren, die senkrecht zu der optischen Achse in der willkürlich genommenen Distanz  $C$  steht.

Diese Methode wurde ihrer Umständlichkeit wegen nicht angewandt, sondern eine andere, die viel einfacher ist und hinreichende Genauigkeit für unseren Zweck besitzt.<sup>1)</sup> Wendet man Gleichung (4) auf die zwei Distanzen eines Paares auf einer Platte an und giebt man den entsprechenden Grössen den Index  $a$  bezw.  $b$ , so hat man, indem die Aenderungen der Distanzen durch Parallaxe und Eigenbewegung in Betracht gezogen werden:

$$A_a = \frac{C}{C'} A'_a \{1 + \frac{A'_a}{C'} \sin i \cos (p_a - \psi)\} - \pi_a H_a - \varepsilon_a t$$

$$A_b = \frac{C}{C'} A'_b \{1 + \frac{A'_b}{C'} \sin i \cos (p_b - \psi)\} - \pi_b H_b - \varepsilon_b t$$

wo  $H_a$  und  $H_b$  die relativen Parallaxen und  $\varepsilon_a$  und  $\varepsilon_b$  die Aenderungen der Distanzen wegen den relativen Eigenbewegungen bezeichnen.

Daraus folgt durch Addition:

$$A_a + A_b = \frac{C}{C'} \{A'_a + A'_b + A\} - (\pi_a H_a + \pi_b H_b) - (\varepsilon_a + \varepsilon_b) t \quad (5)$$

und durch Subtraction:

$$A_a - A_b = \frac{C}{C'} \{A'_a - A'_b + B\} - (\pi_a H_a - \pi_b H_b) - (\varepsilon_a - \varepsilon_b) t \quad (6)$$

$$\text{wo } A = \sin i \{A'_a \frac{A'_a}{C'} \cos (p_a - \psi) + A'_b \frac{A'_b}{C'} \cos (p_b - \psi)\}$$

$$\text{und } B = \sin i \{A'_a \frac{A'_a}{C'} \cos (p_a - \psi) - A'_b \frac{A'_b}{C'} \cos (p_b - \psi)\}.$$

Aus (5) folgt: (bei Entwicklung nach Potenzen von  $\frac{A}{A'_a + A'_b}$ )

$$\frac{C}{C'} = \frac{A_a + A_b}{A'_a + A'_b} + \frac{\mathfrak{A}}{(A'_a + A'_b)} + \dots$$

$$\text{wo } \mathfrak{A} = (\pi_a H_a + \pi_b H_b) + (\varepsilon_a + \varepsilon_b) t - A \frac{A_a + A_b}{A'_a + A'_b}$$

<sup>1)</sup> Vergl. Parallaxes of  $\mu$  and  $\Theta$  Cassiopeiae by Harold Jacoby. Contributions from the Observatory of Columbia College, New-York, No. 5.

und wenn wir diesen Wert in (6) eintragen:

$$\begin{aligned} \Delta_a - \Delta_b &= (\Delta'_a - \Delta'_b) \frac{\Delta_a + \Delta_b}{\Delta'_a + \Delta'_b} \\ &+ B \frac{\Delta_a + \Delta_b}{\Delta'_a + \Delta'_b} - (\pi_a II_a - \pi_b II_b) - (\varepsilon_a - \varepsilon_b) t + \mathfrak{A} \frac{\Delta'_a - \Delta'_b}{\Delta_a + \Delta_b} \end{aligned} \quad (7)$$

setzen wir

$$\frac{\Delta_a + \Delta_b}{\Delta'_a + \Delta'_b} = 1 - \kappa, \quad (8)$$

wonach, aus (7) mit hinreichender Genauigkeit (da  $\kappa$  sehr klein ist gegen 1)

$$\begin{aligned} \Delta_a - \Delta_b &= (\Delta'_a - \Delta'_b) (1 - \kappa) - (\pi_a II_a - \pi_b II_b) - (\varepsilon_a - \varepsilon_b) t \\ &+ B + \mathfrak{A} \frac{\Delta'_a - \Delta'_b}{\Delta_a + \Delta_b}. \end{aligned} \quad (9)$$

Wenn  $\Delta_a$  und  $\Delta_b$  nahezu einander gleich sind, was bei allen Paaren der Fall ist, so darf das letzte Glied vernachlässigt werden; besonders weil, der Symmetrie der Positionswinkel wegen, die Parallaxenglieder in  $\mathfrak{A}$  mit entgegengesetztem Vorzeichen vorkommen und das nämliche gilt auch für die Eigenbewegungsglieder, wenn nur die zwei Vergleichsterne keine Eigenbewegung in ihren Verbindungslinien mit dem Nebel haben.  $B$  darf nur unter der Voraussetzung vernachlässigt werden, dass die gemessenen Distanzen nicht zu gross sind oder dass der Winkel  $i$  klein ist. Es ist nämlich:

$$B \leq 2 \Delta \frac{1}{C} \sin i,$$

$$\text{wenn } \Delta = 25', \text{ dann ist: } \frac{1}{C} = 0.0073$$

$$\text{und } B \leq 21.9 \sin i$$

$$\text{und für } i = 10' \quad B \leq 0.06.$$

Die Distanzen bei Paar 1—2 sind etwa 25'. Ausser diesen sind die Distanzen alle unterhalb 14'. Ferner, da die Kasette wegen dieses Fehlers sorgfältig justiert wurde, ist es höchst unwahrscheinlich, dass  $i$  jemals mehr als 5' betrug.

Gleichung (9) wird dann, bei Vernachlässigung dieser zwei Glieder:

$$\Delta_a - \Delta_b + (\varepsilon_a - \varepsilon_b) t + (\pi_a II_a - \pi_b II_b) - (\Delta'_a - \Delta'_b) (1 - \kappa) = 0. \quad (10)$$

Die Grösse  $\kappa$  ist nach (8) für jedes Paar auf jeder Platte zu berechnen, wobei  $(A_a + A_b)$  willkürlich anzunehmen ist. Es wurden für diese Werte die arithmetischen Mittel aus den respektiven Distanzen auf den ersten 13 Platten angenommen (die Data zur Ausrechnung der Platten 121 und 123 waren damals nicht vorhanden). Die Faktoren  $\kappa$  findet man in Tafel VII und die Grössen  $(A'_a - A'_b)(1 - \kappa)$ , welche „die vollständigen verbesserten Distanzdifferenzen“ genannt worden sind, in Tafel VIII.

Setzen wir nun:

$$\left. \begin{aligned} A_a - A_b &= a + x \\ \varepsilon_a - \varepsilon_b &= y^1) \\ \pi_a II_a - \pi_b II_b &= (\pi_a - \pi_b) II = \pi II \\ (A'_a - A'_b)(1 - \kappa) &= a + n \end{aligned} \right\} \quad (11)$$

Dann schreibt sich (10):

$$x + t y + \pi II - n = 0.^1)$$

Die Messungen auf jeder Platte liefern eine solche Bedingungsgleichung, woraus die Werte von  $x$ ,  $y$  und  $\pi$  für jedes Stern-Paar nach der Methode der kleinsten Quadrate zu berechnen sind.

Offenbar ist dieses Verfahren vollkommen gleichbedeutend mit der Vernachlässigung etwaiger Schiefe der Platte gegen die optische Achse, was, wie gesagt, nur unter Umständen gerechtfertigt ist.

Man sieht, dass die Aberration (indem sie nur eine Aenderung des Scalawertes bei Distanzmessungen bewirkt) mit der letzten Verbesserung hätte vereinigt werden können. Dasselbe gilt, mit hinreichender Strenge, auch für die Refraction, da die Positionswinkel der zwei Sterne eines Paares sich um ungefähr  $180^\circ$  von einander unterscheiden. Es schien aber wünschenswert, diese bekannten Verbesserungen separat einzuführen, um möglicherweise sehen zu können (aus Tafel VII), ob es irgend eine Fehlerquelle gab, welche vom Positionswinkel abhängige Fehler hervorbrachte. Diese Thatsache lieferte eine Controle der Einführung aller Verbesserungen, ausgenommen die Fehler des Messapparates. Man

---

<sup>1)</sup> Bei dem Bau der Bedingungsgleichungen wurde die Bezeichnungsweise so genommen, dass die Gleichungen lauten

$$\begin{aligned} x' + t y' + \pi' II + n &= 0 \\ \text{d. h. } x' &= -x \quad y' = -y \quad \pi' = -\pi. \end{aligned}$$

behandle die Distanzen in Tafel III in derselben Weise, wie mit denen in Tafel VI verfahren wurde bei der Berechnung der vollständig verbesserten Distanzdifferenzen, wobei den willkürlichen Grössen ( $\Delta_a + \Delta_b$ ) die schon angenommenen Mittelwerte zuzuertheilen sind. Die so berechneten Distanzdifferenzen stimmen mit denen in Tafel VIII bis auf zwei in der letzten Decimalstelle überein.

Die Parallaxe-Coefficienten wurden nach folgender Formel berechnet:

$$(S_3 P_3 + S_4 P_4) - (S'_3 P_3 + S'_4 P_4) \quad (\text{Tafel IX})$$

wobei die gestrichenen Buchstaben sich auf den Stern des Paares, welcher die kleinere Distanz vom Nebelstern hat, beziehen und:

$$\begin{aligned} P_3 &= -r \sin \odot & g \sin G &= \sin \delta \cos \alpha & f \sin F &= h \sin (H + \varepsilon) \\ P_4 &= -r \cos \odot & g \cos G &= \sin \alpha & f \cos F &= -\cos \alpha \cos \varepsilon. \\ S_3 &= f \sin (p + F') & h \sin H &= \sin \delta \sin \alpha \\ S_4 &= g \sin (p + G) & h \cos H &= -\cos \delta \end{aligned}$$

$\alpha$  und  $\delta$  sind die Rectascension und Declination des Nebelsternes und  $p$  ist der Positionswinkel des Vergleichsternes, auf den Nebelstern bezogen. Das absolute Glied ist die Differenz zwischen der vollständig verbesserten Distanzdifferenz (aus Tafel VIII) und einem angenommenen Wert derselben, welchen wir auf Seite 13 mit  $a$  bezeichnet haben — positiv, wenn der angenommene Wert der kleinere ist.

Die Gewichte der Platten wurden auf Grund von Bemerkungen über das Aussehen der Bilder festgesetzt. Bei der ersten Auflösung wurden den Platten 48 und 100 Gewichte gleich 0.5 gegeben. Die übrig bleibenden Fehler für diese Platten waren aber so gross, dass es wünschenswert schien, diese Platten entweder ganz auszuschliessen oder wenigstens ihnen sehr kleines Gewicht zu geben. Schon bei der Reduction wurde bemerkt, dass auf diesen Platten der Nebelstern in der Richtung der Rectascension verstellt ist. Es lässt sich vermuten, dass ungenaue Haltung des Fernrohrs an diesem Umstand Schuld war.

Da die absoluten Glieder der Parallaxegleichungen in Einheiten der zweiten Decimalstelle eines Scalateiles ausgedrückt sind, so sind die Resultate der Auflösungen mit 0.6 zu multipliciren,

um dieselbe in Bogensekunden auszudrücken (es ist 1 Scalateil gleich 59'6). Für die Bedingungsgleichungen siehe Tafel X.

Die Resultate aus den einzelnen Auflösungen stelle ich hier zusammen.

| Paar  | Parallaxe | M. F.  |
|-------|-----------|--------|
| 1-2   | +0'068    | ±0'078 |
| 3-4   | +0.130    | ±0.098 |
| 5-6   | +0.176    | ±0.092 |
| 7-8   | +0.094    | ±0.108 |
| 9-10  | +0.146    | ±0.133 |
| 11-12 | +0.064    | ±0.124 |
| 13-14 | +0.029    | ±0.159 |
| 15-16 | +0.059    | ±0.186 |

Diese wurden bei Beilegung von Gewichten gleich den reciproen Quadraten der gegebenen mittleren Fehler vereinigt. Das so gefundene Endresultat ist:

$$H = +0'104 \pm 0'017 \text{ M. F.}$$

Der mittlere Fehler wurde nach der Formel

$$\varepsilon = \pm \sqrt{\frac{[p v v]}{(n-1)[p]}}$$

berechnet.

Die schon erwähnte erste Auflösung lieferte das Resultat:

$$H = +0'074 \pm 0'019.$$

Diese vorliegende Reihe von Platten ist offenbar nicht geeignet, einen guten Wert der Eigenbewegung zu liefern; wenn jedoch eine grosse Eigenbewegung des Nebelsterns existiert, werden diese Messungen einen annähernd richtigen Wert dafür liefern.

Aus (11) S. 13 (bei Berücksichtigung der Fussbemerkung)

$$-y = \varepsilon_a - \varepsilon_b, ^1)$$

wo  $\varepsilon_a$  und  $\varepsilon_b$  diejenigen Aenderungen der Distanzen bezeichnen, welche durch Eigenbewegung der Vergleichsterne und des Nebelsterns eintreten. Denken wir uns für einen Moment den Stern  $a$  als fix, während der Nebelstern sich von  $n$  bis nach  $n_1$  bewegt. Bezeichnen wir die Strecke  $nn_1$  mit  $\varrho$  den Winkel, welchen diese

<sup>1)</sup>  $a$  bezieht sich auf die grössere Distanz.

Linie mit dem Meridian bildet, von Norden nach Osten gemessen, mit  $\chi$  und den Positionswinkel des Sternes  $a$  auf  $n$  bezogen mit  $p_a$  und setzen wir schliesslich:

$$n a = r \qquad n_1 a = r'$$

dann ist:

$$\begin{aligned} r'^2 &= r^2 + \varrho^2 - 2\varrho r \cos(\chi - p_a) \\ r' &= r - \varrho \cos(\chi - p_a) + \dots \\ r - r' &= -\varepsilon_a = \varrho \cos(\chi - p_a) \\ &= \Delta \delta \cos p_a + \Delta \alpha \cos \delta \sin p_a, \end{aligned}$$

welche die Eigenbewegung des Nebelsternes relativ zum Stern  $a$  repräsentiert. Wenn aber der Stern  $a$  eine Eigenbewegung hat, so ist:

$$\begin{aligned} \Delta \delta &= \Delta \delta_n - \Delta \delta_a \\ \Delta \alpha \cos \delta &= \Delta \alpha_n \cos \delta - \Delta \alpha_a \cos \delta, \end{aligned}$$

wo  $\Delta \alpha_n \cos \delta$  und  $\Delta \delta_n$  die Komponente der Eigenbewegung des Nebelsterns bezeichnen, und entsprechend für Stern  $a$ .

Also:

$$-\varepsilon_a = (\Delta \delta_n - \Delta \delta_a) \cos p_a + (\Delta \alpha_n - \Delta \alpha_a) \cos \delta \sin p_a$$

und ähnlich

$$-\varepsilon_b = (\Delta \delta_n - \Delta \delta_b) \cos p_b + (\Delta \alpha_n - \Delta \alpha_b) \cos \delta \sin p_b.$$

Also

$$y = \Delta \delta_n (\cos p_a - \cos p_b) + \Delta \alpha_n \cos \delta (\sin p_a - \sin p_b) - A,$$

wo

$$A = \Delta \delta_a \cos p_a - \Delta \delta_b \cos p_b + (\Delta \alpha_a \sin p_a - \Delta \alpha_b \sin p_b) \cos \delta.$$

Es ist in dieser Rechnung erlaubt,  $\frac{p_a + 180^\circ + p_b}{2} = P$  statt  $p_a$  und  $180^\circ + P$  statt  $p_b$  zu schreiben. Dann ist:

$$y = 2 \Delta \delta_n \cos P + 2 \Delta \alpha_n \cos \delta \sin P - A. \quad (12)$$

Wenn wir dieses letzte Glied ( $A$ ) vernachlässigen, so haben wir eine solche Gleichung für jedes  $y$ , und die Grössen  $\Delta \alpha_n \cos \delta$  und  $\Delta \delta_n$  lassen sich daraus nach der Methode der kleinsten Quadrate bestimmen. Die Vernachlässigung von  $A$  verhält sich bei der Lösung wie ein zufälliger Fehler. Der Wert dieses Gliedes ist die Summe der Komponenten der Eigenbewegungen der zwei

Vergleichsterne in den Richtungen ihrer respectiven Verbindungs-  
linien mit dem Nebelstern. Wenn solche Eigenbewegungen der Ver-  
gleichsterne in erheblicher Weise vorkommen, wird die Unsicherheit  
der Lösung durch die grossen übrigbleibenden Fehler gekennzeichnet.  
Allein in diesem Fall ist eine strenge Lösung unmöglich, denn  
es ist offenbar unmöglich, durch relative Messungen die Bewegung  
eines der Sterne von der gemeinsamen Bewegung der anderen in  
der entgegengesetzten Richtung zu unterscheiden.

Der Gleichung (12) entsprechend haben wir folgende Be-  
dingungsgleichungen, deren Gewichte dem Quadrat des mittleren  
Fehlers der Grösse  $y$  bei der Auflösung der Parallaxe-Gleichungen  
umgekehrt proportional sind:

| $p$                                                                                                       |                                  | $p v v$ |                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------|-------------------------------|
| 0.9                                                                                                       | $-0.200 a + 0.000 b - 0.320 = 0$ | 0.0040  | $a = 10 \Delta a \cos \delta$ |
| 0.1                                                                                                       | $-0.200 + 0.000 + 0.408$         | 0.0439  |                               |
| 0.6                                                                                                       | $-0.200 - 0.007 - 0.483$         | 0.0314  | $b = 10 \Delta \delta$        |
| 1.3                                                                                                       | $-0.136 + 0.147 - 0.194$         | 0.0008  |                               |
| 0.3                                                                                                       | $+0.112 + 0.176 + 0.059$         | 0.0022  |                               |
| 0.5                                                                                                       | $-0.113 - 0.166 - 0.039$         | 0.0057  |                               |
| 0.7                                                                                                       | $-0.131 + 0.151 + 0.064$         | 0.0361  |                               |
| 0.9                                                                                                       | $-0.008 + 0.200 - 0.046$         | 0.0014  |                               |
| Normalgleichungen $1.105 a - 0.252 b + 1.401 = 0$                                                         |                                  |         |                               |
| $+ 1.032 - 0.303 = 0$                                                                                     |                                  |         |                               |
|                                                                                                           |                                  |         | $a = -1.27 \pm 0.45$          |
| Mittlerer Fehler 1 Gl. Gew. 1 = $\pm 0.145$                                                               |                                  |         | $b = -0.0164 \pm 0.45$        |
| Resultate $\begin{cases} \Delta a = -0.0101 \pm 0.0036 \\ \Delta \delta = -0.0002 \pm 0.045. \end{cases}$ |                                  |         |                               |

Im Jahre 1891 wurde der Distanz und Positionswinkel vom  
Nebelstern eines (mit  $a$  bezeichneten) benachbarten Sternes von  
Burnahm mit dem 36 zölligen Refractor der Lick Sternwarte  
gemessen.<sup>1)</sup> Diese Messungen wurden von Barnard<sup>2)</sup> mit dem  
40 zölligen Refractor der Yerkes Sternwarte in den Jahren 1898  
und 1899 wiederholt. Es schien eine Aenderung in Distanz und  
Positionswinkel sich zu zeigen und nachher wurden dieselben  
Messungen auf photographischen Platten von Prof. Leavenworth<sup>3)</sup>  
in Minneapolis und Prof. Scheiner<sup>2)</sup> in Potsdam veröffentlicht.  
Die Möglichkeit ist also vorhanden, einen Wert der Eigenbewegung  
des Nebels zu bestimmen, sobald die Eigenbewegung des Sternes  $a$   
bekannt ist. Diese Bestimmung wird möglich durch Vergleichung

<sup>1)</sup> Pub. Lick Obs. Vol. II 1896 p. 165.

<sup>2)</sup> Monthly Notices Vol. LX p. 348.

<sup>3)</sup> Monthly Notices Vol. LXI p. 26.

einer Reihe von Hall<sup>1)</sup> in Washington gemachten mikrometrischen Messungen dieser und benachbarter Sterne mit den neulich wiederholten Messungen derselben Strecken und Positionswinkel.

Das Material zur Bestimmung der Eigenbewegung von  $\alpha$  stelle ich hier zusammen. Die Gewichte sind die Zahlen der Beobachtungen bezw. Platten. Stern  $f$  habe ich ausgelassen, weil er eine grosse Eigenbewegung zu zeigen scheint, wie Barnard bemerkt hat.

Hall.

| Datum   | Strecke | Winkel | Distanz | Gewicht |
|---------|---------|--------|---------|---------|
| 1877.58 | $a-b$   | 225°5  | 93"90   | 2       |
| 1877.58 | $a-c$   | 268 0  | 115.84  | 2       |
| 1877.59 | $a-d$   | 286.9  | 138.58  | 2       |
| 1877.59 | $a-e$   | 292.6  | 122.90  | 2       |
| 1877.59 | $a-g$   | 350.6  | 77.18   | 2       |

Barnard.

| Datum   | Strecke | Winkel | Distanz | Gewicht |
|---------|---------|--------|---------|---------|
| 1899.51 | $a-b$   | 225°76 | 93"69   | 3       |
| 1899.50 | $a-c$   | 268.78 | 115.72  | 3       |
| 1899.50 | $a-d$   | 286.96 | 137.77  | W 4 D 3 |
| 1899.47 | $a-e$   | 292.81 | 122.28  | 2       |
| 1899.51 | $a-g$   | 350.78 | 76.25   | W 4 D 3 |

Leavenworth.

| Datum   | Strecke | Winkel | Distanz | Gewicht |
|---------|---------|--------|---------|---------|
| 1899.84 | $a-b$   | 225°57 | 94"38   | 1       |
| 1900.13 | $a-c$   | 268.63 | 115.55  | 2       |
| 1900.17 | $a-d$   | 286.76 | 137.44  | 3       |
| 1899.55 | $a-e$   | 292.71 | 122.37  | 4       |
| 1900.17 | $a-g$   | 350.32 | 76.46   | 3       |

Mittel mit Gewicht.

Barnard — Leavenworth.

| Datum   | Strecke | Winkel | Distanz | Gewicht |
|---------|---------|--------|---------|---------|
| 1899.59 | $a-b$   | 225°71 | 93"86   | 4       |
| 1899.75 | $a-c$   | 268.72 | 115.65  | 5       |
| 1899.83 | $a-d$   | 286.87 | 138.60  | W 7 D 6 |
| 1899.52 | $a-e$   | 292.74 | 122.34  | 6       |
| 1899.84 | $a-g$   | 350.58 | 76.36   | W 7 D 6 |

<sup>1)</sup> A. N. No. 2186 Bd. 92.

Bringen wir die Correction wegen der Precession während 22 Jahren an die Hall'schen Positionswinkel ( $= -0^{\circ}14$ ), so haben wir folgende Data:

| Strecke | Positionswinkel |           |       |               | Distanz |        |                |
|---------|-----------------|-----------|-------|---------------|---------|--------|----------------|
|         | Hall            | Hall Cor. | B & L | $\Delta p$    | Hall    | B & L  | $\Delta r$     |
| $a - b$ | 225°5           | 225°4     | 225°8 | $+0^{\circ}4$ | 93°90   | 93.86  | $-0^{\circ}04$ |
| $a - c$ | 268.0           | 267.9     | 268.8 | $+0.9$        | 115.84  | 115.65 | $-0.19$        |
| $a - d$ | 286.9           | 286.8     | 286.9 | $+0.1$        | 138.58  | 137.60 | $-0.98$        |
| $a - e$ | 292.6           | 292.5     | 292.8 | $+0.3$        | 122.90  | 122.34 | $-0.56$        |
| $a - g$ | 350.6           | 350.5     | 350.6 | $+0.1$        | 77.18   | 76.36  | $-0.82$        |

Wir konstruiren jetzt ein ebenes Coordinatensystem mit der Y Achse im Meridian. Bezeichnen ferner die Coordinaten von  $a$  zur Zeit  $t = 0$  mit  $x$  und  $y$ , und die von den Vergleichsternen mit  $x_1, x_2, \dots, y_1, y_2, \dots$  u. s. w. und bezeichnen dieselben Grössen zur Zeit  $t'$  mit gestrichenen Buchstaben. Ferner setzen wir:

$$\begin{aligned} x &= x_1 + \xi_1 & y &= y_1 + \eta_1 \\ x &= x_2 + \xi_2 & y &= y_2 + \eta_2 \\ &\text{u. s. w.} & &\text{u. s. w.} \end{aligned}$$

Es ist dann:

$$\begin{aligned} x &= \frac{x_1 + x_2 + \dots + x_n}{n} + \frac{\xi_1 + \xi_2 + \dots + \xi_n}{n} \\ x' = x + \Delta x &= \frac{x'_1 + x'_2 + \dots + x'_n}{n} + \frac{\xi'_1 + \xi'_2 + \dots + \xi'_n}{n}. \end{aligned}$$

Nehmen wir an, dass

$$\frac{x_1 + x_2 + \dots + x_n}{n} = \frac{x'_1 + x'_2 + \dots + x'_n}{n},$$

dann ist

$$\Delta x = \frac{(\xi'_1 - \xi_1) + (\xi'_2 - \xi_2) + \dots + (\xi'_n - \xi_n)}{n}$$

und entsprechend für  $y$

$$\Delta y = \frac{(\eta'_1 - \eta_1) + (\eta'_2 - \eta_2) + \dots + (\eta'_n - \eta_n)}{n}.$$

Der Bequemlichkeit der numerischen Rechnung halber machen wir folgende Transformation:

$$\begin{aligned}\xi_1 &= -r_1 \sin p_1 \\ \xi'_1 &= -(r_1 + \Delta r_1) \sin (p_1 + \Delta p_1) \\ \eta_1 &= -r_1 \cos p_1 \\ \eta'_1 &= -(r_1 + \Delta r_1) \cos (p_1 + \Delta p_1) \\ \sin (p_1 + \Delta p_1) &= \sin p_1 + \Delta p_1 \cos p_1 + \dots \\ \cos (p_1 + \Delta p_1) &= \cos p_1 - \Delta p_1 \sin p_1 + \dots\end{aligned}$$

also:

$$\Delta x = \frac{\Sigma(-\Delta r \sin p - r \Delta p \cos p)}{n}$$

$$\Delta y = \frac{\Sigma(-\Delta r \cos p + r \Delta p \sin p)}{n}$$

$$\Delta x = \Delta a \cos \delta$$

$$\Delta y = \Delta \delta.$$

Die Auflösung liefert:

$$\Delta a \cos \delta = \frac{-0.43 + 0.12 + 1.01 + 0.77 + 0.27}{5} = +0''.35 \pm 0''.57$$

$$\Delta \delta = \frac{+0.50 + 1.83 - 0.05 + 0.39 - 0.79}{5} = +0''.38 \pm 0''.96$$

$$\text{oder jährlich } \begin{cases} \Delta a \cos \delta = -0''.016 \pm 0''.026 \\ \Delta \delta = -0''.017 \pm 0''.044. \end{cases}$$

Der grosse mittlere Fehler ist auffallend und es lässt sich vermuten, dass ein oder mehrere der Vergleichsterne beträchtliche Eigenbewegungen haben. Ferner sieht man augenblicklich, dass die Distanzmessungen einerseits und die Positionswinkel andererseits, jede für sich betrachtet, Eigenbewegungen für  $a$  in entgegengesetzten Richtungen liefern.

Wir können einen Wert der Eigenbewegung von  $a$  aus den Distanzmessungen allein folgenderweise ableiten:

Bezeichnen wir die Eigenbewegung von  $a$  mit  $\varrho$  und den Winkel, welchen ihre Richtung mit dem Meridian bildet (von Norden durch Osten gemessen) mit  $\chi$ ;  $p$  sei der Positionswinkel des Vergleichsternes bezogen auf  $a$ . Dann ist:

$$\begin{aligned}\Delta r &= -\varrho \cos(\chi - p) \\ &= -\Delta \alpha \cos \delta \sin p - \Delta \delta \cos p.\end{aligned}$$

Für die Positionswinkel allein haben wir entsprechend:

$$\begin{aligned}\sin 1'' r \Delta p &= -\varrho \sin(\chi - p) \\ &= -\Delta \alpha \cos \delta \cos p + \Delta \delta \sin p.\end{aligned}$$

Wir haben also folgende Bedingungsgleichungen:

Aus den Distanzen:

|                  |                  |            |                     |                                        |
|------------------|------------------|------------|---------------------|----------------------------------------|
| + 0.702 <i>b</i> | + 0.712 <i>a</i> | + 0.04 = 0 | <i>vv</i><br>0.0310 |                                        |
| + 0.021          | + 1.000          | + 0.19     | 0.0807              |                                        |
| - 0.278          | + 0.960          | + 0.98     | 0.1030              | <i>a</i> = $\Delta \alpha \cos \delta$ |
| - 0.376          | + 0.926          | + 0.56     | 0.0225              | <i>b</i> = $\Delta \delta$             |
| - 0.985          | + 0.172          | + 0.82     | 0.0034              |                                        |
|                  |                  |            | <hr/> + 0.2400      |                                        |

$$\begin{aligned}\text{Normalgleichungen: } 1.681 \, b - 0.263 \, a - 1.284 &= 0 \\ &+ 3.316 \, a + 1.794 = 0\end{aligned}$$

$$\Delta \alpha \cos \delta = -0''.487 \pm 0''.155$$

$$\Delta \delta = +0.688 \pm 0.217$$

$$\text{oder jährlich: } \Delta \alpha \cos \delta = -0''.022 \pm 0''.007$$

$$\Delta \delta = +0.031 \pm 0.010$$

Aus den Winkeln:

|                  |                  |            |                    |
|------------------|------------------|------------|--------------------|
| + 0.702 <i>a</i> | - 0.712 <i>b</i> | + 0.04 = 0 | <i>vv</i><br>0.022 |
| + 0.021          | - 1.000          | + 0.19     | 0.740              |
| - 0.278          | + 0.960          | + 0.98     | 0.397              |
| - 0.376          | + 0.926          | + 0.56     | 0.032              |
| - 0.985          | + 0.172          | + 0.82     | 0.026              |
|                  |                  |            | <hr/> 1.217        |

$$\text{Normalgleichungen: } 1.68 \, a + 0.26 \, b - 0.05 = 0$$

$$3.32 \, b + 3.13 = 0$$

$$\Delta \alpha \cos \delta = +0.18 \pm 0.50$$

$$\Delta \delta = -0.96 \pm 0.35$$

$$\text{oder jährlich: } \Delta \alpha \cos \delta = +0''.008 \pm 0''.023$$

$$\Delta \delta = -0.044 \pm 0.016$$

Schreiben wir diesen Resultaten Gewichte zu, die dem reciprocen Quadrat der mittleren Fehler proportional sind, so bekommen wir:

$$\Delta \alpha \cos \delta = -0''.43 \pm 0''.15$$

$$\Delta \delta = +0.22 \pm 0.18$$

$$\text{oder jährlich: } \Delta \alpha \cos \delta = -0''.020 \pm 0''.007$$

$$\Delta \delta = +0.010 \pm 0.010.$$

Obgleich diese Resultate wenig befriedigend sind, dürfen wir doch schliessen, dass der Stern  $a$  keine beträchtliche Eigenbewegung hat.

Das Material zur Bestimmung der Eigenbewegung des Nebelsternes, wenn die des Sternes  $a$  bekannt ist, ist von Prof. Leavenworth<sup>1)</sup> zusammengestellt worden. Es ist folgendes:

Gew.

|   |             |         |       |       |
|---|-------------|---------|-------|-------|
| 5 | Burnahm     | 1891.45 | 87.8  | 61.70 |
| 1 | Scheiner    | 1894.83 | 89.07 | 60.85 |
| 5 | Barnard     | 1898.60 | 88.77 | 60.70 |
| 5 | Barnard     | 1899.48 | 89.14 | 60.66 |
| 4 | Leavenworth | 1899.55 | 89.29 | 60.56 |

Die Gewichte sind der Anzahl der Beobachtungen bezw. der Platten gleich. Der Stern  $a$  ist auf den Nebel bezogen.

Da der Positionswinkel nahezu gleich  $90^\circ$  ist, wird es sich empfehlen,  $\Delta a$  aus den Distanzen und  $\Delta \delta$  aus den Positionswinkeln zu bestimmen. Bezeichnen wir mit  $r$  und  $p$  die Distanzen und Positionswinkel zur Zeit  $t = 1895.0$  und die entsprechenden Grössen zur Zeit  $t'$  mit gestrichenen Buchstaben.  $\Delta \alpha_a \cos \delta$  und  $\Delta \delta_a$  bezeichnen die Componenten der Eigenbewegung von  $a$  und  $\Delta \alpha_n \cos \delta$ ,  $\Delta \delta_n$  die entsprechenden Grössen für den Nebelstern. Es ist dann:

$$r + t(\Delta \alpha_a - \Delta \alpha_n) \cos \delta = r'$$

oder 
$$x - t y + n = 0,$$

wo: 
$$\begin{aligned} x &= r - 60.50 \\ y &= \Delta \alpha_n \cos \delta \\ n &= t \Delta \alpha_a \cos \delta + 60.50 - r' \end{aligned}$$

und 
$$(p)'' r'' \sin 1'' + t(\Delta \delta_n'' - \Delta \delta_a'') = (p')'' r'' \sin 1''$$

oder 
$$10^4 x + \frac{t}{r'' \sin 1''} y - n = 0,$$

wo: 
$$\begin{aligned} x &= (p - 88.50)'' 10^{-4} \\ y &= \Delta \delta_n'' \\ n &= (p' - 88.50)'' + \frac{t \Delta \delta_a''}{r'' \sin 1''}. \end{aligned}$$

<sup>1)</sup> Monthly Notices Vol. LXI p. 26.

Die Bedingungsgleichungen sind folgende (indem wir die Gleichungen des zweiten Systems mit  $10^4$  dividieren):

| Aus Distanzen: |                              |  | $p v v$       |
|----------------|------------------------------|--|---------------|
| Gew.           |                              |  |               |
| 5              | $1.00 x - 3.55 y - 1.27 = 0$ |  | 0.0080        |
| 1              | $- 0.17 - 0.35$              |  | 0.1369        |
| 5              | $+ 3.60 - 0.13$              |  | 0.0005        |
| 5              | $+ 4.48 - 0.07$              |  | 0.0180        |
| 4              | $+ 4.55 + 0.03$              |  | 0.0016        |
|                |                              |  | <u>0.1650</u> |

$$\text{Normalgleichungen: } 20.0 x + 40.7 y - 7.58 = 0$$

$$+ 311 y + 19.4 = 0$$

$$(\text{jährlich}) \Delta \alpha \cos \delta = -0''.15 \pm 0''.016$$

$$\Delta \alpha = -0''.012 \pm 0''.0013$$

Aus Positionswinkeln:

|                               | $p v v$       |
|-------------------------------|---------------|
| $1.00 x - 1.22 y + 0.253 = 0$ | 0.0020        |
| $- 0.06 - 0.206$              | 0.0595        |
| $+ 1.23 - 0.098$              | 0.0328        |
| $+ 1.54 - 0.232$              | 0.0000        |
| $+ 1.56 - 0.237$              | 0.0140        |
|                               | <u>0.1083</u> |

$$\text{Normalgleichungen: } 20.0 x + 13.9 y - 1.76 = 0$$

$$+ 36.5 y - 5.71 = 0$$

$$(\text{jährlich}) \Delta \delta = +0''.168 \pm 0.037.$$

Die Correction wegen jährlicher Precession wurde vernachlässigt:

$$\frac{d p}{d t} = n \sin \alpha \sec \delta = -0''.0065 = -23''.4.$$

Dies entspricht  $\Delta \delta = -23''.4 r \sin 1'' = -0''.007.$

Obiger Wert verlangt also eine Verbesserung von  $+0''.007$

$$\Delta \delta = +0''.175 \pm 0''.037.$$

Eine Vereinigung dieser Resultate mit denen, die aus der Parallaxe-Bestimmung abgeleitet wurden, ergibt, wenn man noch Gewichte proportional dem reciprocen Quadrat des mittleren Fehlers beilegt, folgenden Wert der Eigenbewegung des Nebelsterns:

$$\Delta \alpha = -0''.012 \pm 0''.0012$$

$$\Delta \delta = +0''.10 \pm 0''.029.$$

Dass der Zentralstern des Ringnebels in der Leyer mit dem Nebel physisch verbunden ist, wird dadurch einigermassen wahrscheinlich gemacht, dass fast alle ähnlichen Objecte „Zentral-

sterne“ besitzen.<sup>1)</sup> Bei genauer Focussierung hat man ferner herausgestellt, dass die Einstellungen für den Zentralstern etwa in der Mitte liegen zwischen denen für den Nebel und denen für einen gewöhnlichen Fixstern, was beim Vorherrschen kurzweiliger Strahlen im Nebellicht für die Annahme einer nebligen Structur des Zentralsternes spricht.<sup>2)</sup>

Zum Schluss möchte ich meinen Dank denen aussprechen, unter deren Leitung diese Arbeit ausgeführt worden ist, namentlich: Herrn Prof. Leavenworth, welchem ich die Anregung und die Möglichkeit der Untersuchung verdanke, indem er mir in gütiger Weise die Instrumente der Sternwarte zur Verfügung stellte, und ebenso danke ich Herrn Prof. Dr. Seeliger, unter dessen Führung diese Arbeit vollendet wurde.

---

<sup>1)</sup> Siehe Pub. Lick Obs. Vol. II pag. 159.

<sup>2)</sup> Näheres hierüber siehe: Scheiner, Astr. N. Bd. 129 pag. 239. Keeler Astr. N. Bd. 130 pag. 227. Barnard, Monthly Notices Vol. LX pag. 255.

Ueber einen Versuch, die Parallaxe zweier planetarischen Nebel zu bestimmen. siehe: Astr. N. Bd. 133 p. 353, Bd. 136 p. 349.

Der Verfasser dieser Arbeit ist in Ellenville N. Y. in den Vereinigten Staaten von Amerika geboren und zwar am 1. Mai 1876. Nach vierjährigem Besuch der „High School“ in Minneapolis, in Minnesota, promovierte er und besuchte die Universität von Minnesota in Minneapolis. Im Jahre 1897 erlangte er den Grad „Bachelor in Artibus“ und im Jahre 1899 den Grad „Magister in Artibus“.

Vom September 1897 bis Juli 1900 war er „Assistant“ in der Sternwarte der Universität von Minnesota. Seit August 1900 ist er in München, woselbst er Vorlesungen über Astronomie, Mathematik und Physik hört.

## Tafel I.

## Sternwarte der Universität von Minnesota.

Länge 6<sup>h</sup> 12<sup>m</sup> 56<sup>s</sup> 8 W von Gr. Breite 44° 58' 40". Position des Nebels:  $\alpha$  18<sup>h</sup> 48<sup>m</sup> 23<sup>s</sup>,  $\delta$  + 32° 51'.

| Platte | Datum          | Ge-<br>macht<br>von | Expositions-Zeit                | Zenith-<br>Distanz              | Par.<br>Winkel | Therm.  | Bar.  | Bemerkungen                         |
|--------|----------------|---------------------|---------------------------------|---------------------------------|----------------|---------|-------|-------------------------------------|
| 40     | Sept. 1. 1897  | L.                  | 21 <sup>h</sup> 20 <sup>m</sup> | 22 <sup>h</sup> 48 <sup>m</sup> | 39° 26'        |         |       | Nebelstern schwach                  |
| 42     | Sept. 18. 1897 | Beane               | Mittel 21 <sup>h</sup>          | — 42                            | 35 3           | 57° 24' |       | Bilder sehr schlecht.               |
| 48     | Sept. 23. 1897 | Beane               | 22                              | 0                               | 38 19          | 57 21   | 29.25 | Stern 4 schwach und nebelhaft.      |
| 100    | Sept. 11. 1899 | Bauer               | 21 <sup>h</sup> 44 <sup>m</sup> | 24 10                           | 48 21          | 56 32   | 29.0  | Bilder verlängert.                  |
| 103    | Oct. 4. 1899   | N.                  | 20 9                            | 22 38                           | 32 14          | 56 28   | 29.5  | Bilder gut.                         |
| 105    | Oct. 30. 1899  | N.                  | 21 4                            | 23 4                            | 39 11          | 57 23   | 29.18 | Bilder doppelt.                     |
| 107    | Nov. 1. 1899   | N.                  | 21 4                            | 23 8                            | 39 32          | 57 23   | 29.65 | Mittelmässig.                       |
| 110    | März 30. 1900  | N.                  | 14 47                           | 16 48                           | 37 15          | 57 18   | 29.55 | Stern 2 verlängert.                 |
| 111    | April 1. 1900  | N.                  | 15 13                           | 16 54                           | 34 24          | 56 58   | 29.22 | Nebelstern stärker auf einer Seite. |
| 113    | Mai 2. 1900    | N.                  | 16 40                           | 18 15                           | 19 57          | 46 44   | 29.30 | Bilder gross und nebelhaft.         |
| 114    | Mai 3. 1900    | N.                  | 16 12                           | 18 7                            | 22 48          | 50 40   | 29.18 | Bilder sehr gut.                    |
| 117    | Mai 26. 1900   | N.                  | 16 47                           | 18 43                           | 17 32          | 41 39   | 29.18 | " " "                               |
| 119    | Jun. 5. 1900   | N.                  | 17 21                           | 19 26                           | 13 11          | 21 39   | 28.88 | " " "                               |
| 121    | Sept. 17. 1900 | L.                  | 20 42                           | 22 44                           | 35 23          | 57 7    | 29.4  | " " "                               |
| 123    | Sept. 21. 1900 | L.                  | 20 30                           | 22 30                           | 33 6           | 56 40   | 29.2  | " " "                               |

L. = Prof. F. P. Leavenworth. Beane = Prof. Beane, Professor der Physik an der „North Side High School“ in Minneapolis. Bauer = Dr. George N. Bauer, jetziger „Instructor in Mathematics“ in der Universität von Minnesota. N. = B. L. Newkirk.

Die Werte der Zenith-Distanzen und der parallactischen Winkel wurden mit Werten der Expositionszeiten ein wenig anders von diesen hier gegebenen berechnet, denn die Fehler der Uhr waren mir zur Zeit der Ausrechnung unbekannt.

Tafel II.

Zur Identification der Vergleichsterne.

| Stern | Positions-<br>Winkel | Distanz | Grösse            |
|-------|----------------------|---------|-------------------|
| 1     | 88° 6'               | 1494.1  | 13.0 <sup>m</sup> |
| 2     | 269 48               | 1520.1  | 12.8              |
| 3     | 88 21                | 819.4   | 11.0              |
| 4     | 270 42               | 827.2   | 14.2              |
| 5     | 87 42                | 575.2   | 13                |
| 6     | 267 57               | 613.1   | 14                |
| 7     | 317 23               | 236.5   | 13                |
| 8     | 136 22               | 232.7   | 13                |
| 9     | 41 48                | 264.0   | 14                |
| 10    | 206 27               | 258.6   | 13.5              |
| 11    | 35 14                | 596.5   | 14                |
| 12    | 213 42               | 599.4   | 13.5              |
| 13    | 313 20               | 752.0   | 11                |
| 14    | 144 47               | 626.2   | 11.2              |
| 15    | 357 34               | 730.0   | 13                |
| 16    | 179 41               | 670.4   | 13.5              |

Tafel III.  
Gemessene Distanzen, wegen der Fehler des Messapparates corrigiert.

| Stern<br>Platte | 1       | 2       | 3       | 4       | 5      | 6       | 7      | 8      | 9      | 10     | 11      | 12      | 13      | 14      | 15      | 16      |
|-----------------|---------|---------|---------|---------|--------|---------|--------|--------|--------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 40              | 25 0416 | 25 4930 |         |         | 9.6289 | 10.2892 | 3.9675 | 3.8992 | 4.4252 | 4.3304 | 10.0101 | 10.0512 | 12.6039 | 10.4994 | 12.2302 | 11.2408 |
| 42              | 25 0538 | 25 4973 |         |         | 9.6432 | 10.2870 | 3.9676 | 3.8965 | 4.4374 | 4.3434 | 9.9974  | 10.0642 | 12.6000 | 10.5170 | 12.2416 | 11.2417 |
| 48              | 25.0604 | 25.4750 | 13.7512 | 13.8618 | 9.6613 | 10.2778 | 3.9621 | 3.9043 | 4.4422 | 4.3281 | 10.0276 | 10.0456 | 12.6151 | 10.5065 | 12.2523 | 11.2325 |
| 100             | 25.0222 | 25.4866 | 13.7119 | 13.8775 | 9.6224 | 10.2906 | 3.9721 | 3.8888 | 4.4105 | 4.3306 | 9.9973  | 10.0442 | 12.6094 | 10.4879 | 12.2316 | 11.2298 |
| 103             | 25.0454 | 25.4678 | 13.7412 | 13.8516 | 9.6457 | 10.2660 | 3.9552 | 3.9042 | 4.4261 | 4.3327 | 9.9958  | 10.0443 | 12.6044 | 10.5019 | 12.2292 | 11.2305 |
| 105             | 25.0434 | 25.4742 |         |         | 9.6362 | 10.2590 | 3.9603 | 3.9034 | 4.4186 | 4.3416 | 9.9898  | 10.0542 | 12.5990 | 10.5006 | 12.2300 | 11.2426 |
| 107             | 25.0360 | 25.4683 | 13.7274 | 13.8583 | 9.6424 | 10.2686 | 3.9650 | 3.9014 | 4.4272 | 4.3265 | 10.0072 | 10.0482 | 12.6067 | 10.5028 | 12.2354 | 11.2332 |
| 110             | 25.0323 | 25.4695 | 13.7322 | 13.8666 | 9.6409 | 10.2696 | 3.9632 | 3.8992 | 4.4172 | 4.3360 | 9.9935  | 10.0511 | 12.5994 | 10.5005 | 12.2296 | 11.2332 |
| 111             | 25.0327 | 25.4737 | 13.7344 | 13.8667 | 9.6435 | 10.2774 | 3.9702 | 3.8985 | 4.4200 | 4.3298 | 10.0036 | 10.0460 | 12.6062 | 10.4973 | 12.2360 | 11.2262 |
| 113             | 25.0542 | 25.4752 | 13.7402 | 13.8601 | 9.6402 | 10.2802 | 3.9620 | 3.9130 | 4.4137 | 4.3470 | 10.0020 | 10.0647 | 12.6000 | 10.5135 | 12.2278 | 11.2478 |
| 114             | 25.0408 | 25.4716 | 13.7383 | 13.8726 | 9.6454 | 10.2804 | 3.9646 | 3.9020 | 4.4270 | 4.3281 | 10.0058 | 10.0548 | 12.6084 | 10.5030 | 12.2285 | 11.2394 |
| 117             | 25.0496 | 25.4880 | 13.7305 | 13.8722 | 9.6378 | 10.2816 | 3.9694 | 3.9055 | 4.4289 | 4.3318 | 10.0000 | 10.0457 | 12.6073 | 10.4984 | 12.2364 | 11.2380 |
| 119             | 25.0444 | 25.4821 | 13.7304 | 13.8656 | 9.6396 | 10.2775 | 3.9634 | 3.9008 | 4.4204 | 4.3332 | 10.0005 | 10.0481 | 12.6078 | 10.4984 | 12.2330 | 11.2342 |
| 121             | 25.0460 | 25.4776 |         |         | 9.6432 | 10.2783 | 3.9665 | 3.9066 | 4.4320 | 4.3326 | 9.9990  | 10.0558 | 12.6009 | 10.5028 | 12.2335 | 11.2408 |
| 123             | 25.0500 | 25.4796 | 13.7369 | 13.8636 | 9.6466 | 10.2676 | 3.9636 | 3.9070 | 4.4328 | 4.3263 | 10.0080 | 10.0380 | 12.6062 | 10.5120 | 12.2295 | 11.2452 |

Tafel IV.

Correctionen wegen Refraction.

| Platte | $\zeta$ | Stern<br>$\log k$ | 1   | 2   | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|--------|---------|-------------------|-----|-----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 100    | 48° 21' | 6.420             | 128 | 129 | 71 | 70 | 50 | 53 | 12 | 11 | 26 | 23 | 56 | 56 | 36 | 28 | 44 | 41 |
| 40     | 39 26   | 6.444             | 106 | 108 | 58 | 58 | 41 | 44 | 12 | 11 | 20 | 18 | 45 | 44 | 37 | 30 | 41 | 38 |
| 42     | 35 3    | 6.444             | 96  | 97  | 52 | 53 | 37 | 40 | 12 | 11 | 18 | 17 | 40 | 40 | 37 | 30 | 39 | 36 |
| 114    | 22 48   | 6.451             | 80  | 81  | 44 | 44 | 31 | 33 | 12 | 11 | 15 | 14 | 33 | 33 | 36 | 30 | 38 | 35 |
| 119    | 13 11   | 6.451             | 70  | 71  | 38 | 39 | 27 | 29 | 11 | 11 | 13 | 15 | 30 | 30 | 35 | 29 | 37 | 34 |

Correctionen.

| Platte | $\zeta$ | Stern<br>$\frac{k'}{k}$ | 1   | 2   | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|--------|---------|-------------------------|-----|-----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 40     | 39° 26' | 1.000                   | 106 | 108 |    |    | 41 | 44 | 12 | 11 | 20 | 18 | 45 | 44 | 37 | 30 | 41 | 38 |
| 42     | 35 3    | 1.000                   | 96  | 97  |    |    | 37 | 40 | 12 | 11 | 18 | 17 | 43 | 42 | 36 | 29 | 39 | 36 |
| 48     | 38 19   | 0.968                   | 99  | 100 | 53 | 53 | 39 | 42 | 12 | 11 | 19 | 17 | 43 | 42 | 36 | 29 | 39 | 36 |
| 100    | 48 21   | 1.000                   | 128 | 129 | 71 | 70 | 50 | 53 | 12 | 11 | 26 | 23 | 56 | 56 | 36 | 28 | 44 | 41 |
| 103    | 32 14   | 1.005                   | 88  | 89  | 48 | 49 | 34 | 37 | 12 | 11 | 17 | 16 | 37 | 37 | 37 | 30 | 39 | 36 |
| 105    | 39 11   | 0.982                   | 103 | 104 |    |    | 40 | 43 | 12 | 11 | 20 | 18 | 44 | 43 | 36 | 29 | 40 | 37 |
| 107    | 39 32   | 1.048                   | 111 | 113 | 61 | 61 | 43 | 46 | 13 | 12 | 21 | 19 | 47 | 46 | 39 | 32 | 43 | 40 |
| 110    | 37 15   | 1.045                   | 106 | 108 | 58 | 58 | 41 | 44 | 13 | 12 | 20 | 19 | 44 | 41 | 39 | 32 | 42 | 39 |
| 111    | 34 24   | 1.019                   | 96  | 97  | 52 | 53 | 37 | 40 | 12 | 11 | 18 | 17 | 40 | 40 | 38 | 31 | 40 | 37 |
| 113    | 19 57   | 1.002                   | 77  | 78  | 42 | 42 | 30 | 32 | 12 | 11 | 14 | 14 | 32 | 32 | 36 | 30 | 38 | 35 |
| 114    | 22 48   | 1.000                   | 80  | 81  | 44 | 44 | 31 | 33 | 12 | 11 | 15 | 14 | 33 | 33 | 36 | 30 | 38 | 35 |
| 117    | 17 32   | 0.957                   | 72  | 73  | 39 | 39 | 30 | 32 | 11 | 11 | 13 | 13 | 30 | 30 | 34 | 29 | 36 | 33 |
| 119    | 13 11   | 0.918                   | 64  | 65  | 35 | 36 | 24 | 27 | 10 | 10 | 12 | 12 | 28 | 28 | 32 | 27 | 34 | 31 |
| 121    | 35 23   | 1.000                   | 97  | 98  |    |    | 37 | 40 | 12 | 11 | 18 | 17 | 40 | 40 | 37 | 30 | 39 | 36 |
| 123    | 33 6    | 0.975                   | 89  | 90  | 48 | 49 | 34 | 37 | 12 | 11 | 17 | 16 | 37 | 37 | 36 | 29 | 36 | 34 |

Diese Correctionen sind in der vierten Decimalstelle eines Scalateiles gegeben und sind mit dem positiven Vorzeichen unmittelbar anzubringen.

Tafel V.

Correction wegen Aberration.

| Platte | $\frac{\Delta s}{s}$ |
|--------|----------------------|
| 40     | — 0.438              |
| 42     | — 0.519              |
| 48     | — 0.535              |
| 100    | — 0.489              |
| 103    | — 0.557              |
| 105    | — 0.532              |
| 107    | — 0.525              |
| 110    | + 0.556              |
| 111    | + 0.558              |
| 113    | + 0.515              |
| 114    | + 0.510              |
| 117    | + 0.385              |
| 119    | + 0.313              |
| 121    | — 0.513              |
| 123    | — 0.527              |

Die Correctionen werden erhalten durch Multiplikation der Strecke (in ganzen Scalateilen ausgedrückt) mit dem Faktor,  $\frac{\Delta s}{s}$ , und ist mit dem eben versehenen Vorzeichen anzubringen. Die so gefundene Correction ist in Einheiten der vierten Decimalstelle eines Scalateiles ausgedrückt.

Tafel VI.  
Distanzen, wegen Tangentialdistorsion, Refraction und Aberration corrigirt.

| Stern<br>Platte | 1       | 2       | 3       | 4       | 5      | 6       | 7      | 8      | 9      | 10     | 11      | 12      | 13      | 14      | 15      | 16      |
|-----------------|---------|---------|---------|---------|--------|---------|--------|--------|--------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 40              | 25.0507 | 25.5022 |         |         | 9.6326 | 10.2032 | 3.9687 | 3.9001 | 4.4270 | 4.3320 | 10.0142 | 10.0552 | 12.6070 | 10.5019 | 12.2338 | 11.2441 |
| 42              | 25.0617 | 25.5032 |         |         | 9.6464 | 10.2905 | 3.9686 | 3.8974 | 4.4390 | 4.3449 | 10.0009 | 10.0677 | 12.6031 | 10.5105 | 12.2449 | 11.2447 |
| 48              | 25.0686 | 25.4836 | 13.7556 | 13.8664 | 9.6647 | 10.2515 | 3.9631 | 3.9052 | 4.4439 | 4.3296 | 10.0314 | 10.0493 | 12.6181 | 10.5089 | 12.2556 | 11.2355 |
| 100             | 25.0334 | 25.4978 | 13.7181 | 13.8839 | 9.6269 | 10.2954 | 3.9731 | 3.8897 | 4.4219 | 4.3327 | 10.0024 | 10.0493 | 12.6124 | 10.4502 | 12.2324 | 11.2334 |
| 103             | 25.0524 | 25.4748 | 13.7453 | 13.8558 | 6.6436 | 10.2692 | 3.9562 | 3.9051 | 4.4276 | 4.3341 | 9.9930  | 10.0475 | 12.6075 | 10.5043 | 12.2325 | 11.2335 |
| 105             | 25.0520 | 25.4827 |         |         | 9.6397 | 10.2628 | 3.9613 | 3.9043 | 4.4204 | 4.3432 | 9.9937  | 10.0580 | 12.6020 | 10.5030 | 12.2331 | 11.2457 |
| 107             | 25.0454 | 25.4777 | 13.7328 | 13.8637 | 9.6162 | 10.2727 | 3.9661 | 3.9024 | 4.4291 | 4.3282 | 10.0114 | 10.0523 | 12.6100 | 10.5035 | 12.2391 | 11.2366 |
| 110             | 25.0439 | 25.4813 | 13.7387 | 13.8731 | 9.6465 | 10.2715 | 3.9647 | 3.9006 | 4.4194 | 4.3381 | 9.9984  | 10.0560 | 12.6039 | 10.5012 | 12.2344 | 11.2377 |
| 111             | 25.0437 | 25.4848 | 13.7403 | 13.8727 | 9.6477 | 10.2819 | 3.9716 | 3.8998 | 4.4310 | 4.3317 | 10.0081 | 10.0505 | 12.6106 | 10.5009 | 12.2406 | 11.2305 |
| 113             | 25.0628 | 25.4838 | 13.7451 | 13.8650 | 9.6437 | 10.2839 | 3.9634 | 3.9143 | 4.4153 | 4.3436 | 10.0037 | 10.0684 | 12.6042 | 10.5170 | 12.2322 | 11.2519 |
| 114             | 25.0497 | 25.4805 | 13.7137 | 13.8777 | 9.6490 | 10.2842 | 3.9660 | 3.9033 | 4.4287 | 4.3297 | 10.0096 | 10.0586 | 12.6126 | 10.5065 | 12.2329 | 11.2435 |
| 117             | 25.0574 | 25.4958 | 13.7349 | 13.8766 | 9.6412 | 10.2832 | 3.9707 | 3.9068 | 4.4304 | 4.3333 | 10.0034 | 10.0491 | 12.6112 | 10.5017 | 12.2405 | 11.2417 |
| 119             | 25.0512 | 25.4889 | 13.7343 | 13.8696 | 9.6423 | 10.2505 | 3.9645 | 3.9019 | 4.4217 | 4.3345 | 10.0036 | 10.0512 | 12.6114 | 10.5014 | 12.2385 | 11.2377 |
| 121             | 25.0540 | 25.4856 |         |         | 9.6464 | 10.2518 | 3.9675 | 3.9075 | 4.4336 | 4.3341 | 10.0025 | 10.0598 | 12.6040 | 10.5053 | 12.2365 | 11.2438 |
| 123             | 25.0572 | 25.4868 | 13.8677 | 13.7411 | 9.6495 | 10.2708 | 3.9646 | 3.9079 | 4.4343 | 4.3277 | 10.0112 | 10.0412 | 12.6092 | 10.5114 | 12.2325 | 11.2430 |

Tafel VII.

Correction wegen Verschiedenheit des Scalawertes.

| Distanz<br>Platte | 1-2    | 3-4   | 5-6    | 7-8    | 9-10   | 11-12 | 13 14 | 15-16 |
|-------------------|--------|-------|--------|--------|--------|-------|-------|-------|
| 40                | - 2.67 |       | - 0.2  | - 0.4  | + 4.3  | - 4.1 | + 2.1 | - 0.1 |
| 42                | - 5.45 |       | - 5.8  | + 2.9  | - 24.1 | - 3.7 | - 3.8 | - 5.1 |
| 48                | - 2.53 | - 4.6 | - 10.5 | 0.0    | - 12.2 | - 9.8 | - 5.7 | - 5.7 |
| 100               | + 1.62 | + 2.6 | + 1.6  | + 7.0  | + 9.4  | + 4.7 | + 4.8 | + 3.7 |
| 103               | + 2.42 | + 3.0 | + 3.8  | + 8.9  | + 1.3  | + 7.3 | + 0.9 | + 4.9 |
| 105               | + 0.91 |       | + 11.5 | + 3.4  | - 0.9  | + 4.7 | + 3.8 | - 0.6 |
| 107               | + 3.21 | + 4.7 | + 3.3  | - 0.2  | + 6.3  | - 1.3 | - 0.7 | + 0.8 |
| 110               | + 2.81 | - 0.9 | + 2.7  | + 3.8  | + 6.2  | + 3.3 | + 2.5 | + 2.3 |
| 111               | + 2.16 | - 1.3 | - 2.1  | - 4.0  | + 0.1  | + 1.2 | + 1.0 | + 2.8 |
| 113               | - 1.43 | - 0.2 | - 1.1  | - 12.0 | - 1.3  | - 6.5 | - 3.2 | - 2.8 |
| 114               | + 0.82 | - 4.4 | - 3.9  | - 1.3  | + 5.0  | - 3.5 | - 2.3 | + 0.5 |
| 117               | - 2.74 | - 0.8 | - 0.5  | - 11.7 | - 1.0  | + 4.3 | + 0.4 | - 2.0 |
| 119               | - 0.14 | + 2.0 | + 1.3  | + 2.4  | + 7.5  | + 3.1 | + 0.5 | + 1.3 |
| 121               | - 0.04 |       | - 1.4  | - 8.5  | - 5.6  | - 0.4 | + 2.0 | - 1.3 |
| 123               | - 0.96 | + 0.2 | + 2.6  | + 0.8  | + 0.9  | + 4.3 | - 4.2 | - 1.2 |

Diese Faktoren sind mit der zu verbessernden Distanz (in Scalateilen) zu multiplizieren, um die Correction in Einheiten der vierten Decimalstelle einer Scaladivision zu erhalten.

Tafel VIII.

Vollständig verbesserte Distanzdifferenzen.

| Sternpaar<br>Platte | 1-2    | 3-4    | 5-6    | 7-8    | 9-10   | 11-12  | 13-14  | 15-16  |
|---------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 40                  | 0.4514 |        | 0.6606 | 0.0683 | 0.0950 | 0.0410 | 2.1056 | 0.9897 |
| 42                  | 0.4432 |        | 0.6436 | 0.0711 | 0.0938 | 0.0668 | 2.0828 | 0.9997 |
| 48                  | 0.4148 | 0.1106 | 0.6161 | 0.0579 | 0.1142 | 0.0179 | 2.1080 | 1.0195 |
| 100                 | 0.4643 | 0.1656 | 0.6686 | 0.0834 | 0.0892 | 0.0470 | 2.1232 | 1.0025 |
| 103                 | 0.4225 | 0.1106 | 0.6207 | 0.0511 | 0.0936 | 0.0485 | 2.1034 | 0.9995 |
| 105                 | 0.4308 |        | 0.6239 | 0.0570 | 0.0772 | 0.0643 | 2.0998 | 0.9876 |
| 107                 | 0.4325 | 0.1310 | 0.6267 | 0.0637 | 0.1010 | 0.0409 | 2.1044 | 1.0026 |
| 110                 | 0.4375 | 0.1344 | 0.6291 | 0.0641 | 0.0813 | 0.0576 | 2.1002 | 0.9969 |
| 111                 | 0.4412 | 0.1324 | 0.6341 | 0.0718 | 0.0993 | 0.0424 | 2.1100 | 1.0104 |
| 113                 | 0.4209 | 0.1200 | 0.6401 | 0.0491 | 0.0666 | 0.0627 | 2.0866 | 0.9800 |
| 114                 | 0.4308 | 0.1340 | 0.6350 | 0.0628 | 0.0990 | 0.0490 | 2.1056 | 0.9894 |
| 117                 | 0.4382 | 0.1415 | 0.6440 | 0.0639 | 0.0971 | 0.0458 | 2.1096 | 0.9986 |
| 119                 | 0.4377 | 0.1354 | 0.6382 | 0.0625 | 0.0872 | 0.0476 | 2.1101 | 0.9992 |
| 121                 | 0.4316 |        | 0.6352 | 0.0600 | 0.0995 | 0.0568 | 2.0991 | 0.9929 |
| 123                 | 0.4296 | 0.1266 | 0.6213 | 0.0567 | 0.1066 | 0.0300 | 2.0940 | 0.9845 |

Tafel IX.

Parallaxe Coefficienten.

| Stern | 1        | 2        | 3        | 4        | 5        | 6        | 7        | 8        |
|-------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| $S_3$ | — 0.2210 | + 0.368  | — 0.2175 | + 0.1839 | — 0.2269 | + 0.2232 | — 0.4732 | + 0.4607 |
| $S_4$ | — 0.9730 | + 0.9772 | — 0.9736 | + 0.9786 | — 0.9718 | + 0.9725 | + 0.7463 | — 0.7575 |

| Stern | 9        | 10       | 11       | 12       | 13       | 14       | 15       | 16       |
|-------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| $S_3$ | — 0.7417 | + 0.8219 | — 0.7830 | + 0.7910 | — 0.4228 | + 0.5594 | — 0.8126 | + 0.8204 |
| $S_4$ | — 0.5659 | + 0.3322 | — 0.4701 | + 0.4467 | + 0.7896 | — 0.6574 | + 0.1562 | — 0.1199 |

| Platte | 40      | 42      | 48      | 100     | 103     | 105     | 107     | 110     | 111     | 113     | 114     | 117 | 119 | 121 | 123 |
|--------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|-----|-----|-----|-----|
| $P_3$  | — 0.358 | — 0.074 | + 0.012 | — 0.201 | + 0.190 | + 0.607 | — 0.178 | — 0.675 | — 0.916 | — 0.977 | — 0.070 |     |     |     |     |
| $P_4$  | + 0.943 | + 1.001 | + 1.004 | + 0.986 | + 0.982 | + 0.784 | — 0.984 | — 0.749 | — 0.433 | — 0.275 | + 1.002 |     |     |     |     |

Tafel X.

Bedingungsgleichungen. Paar 1—2.

Angenommener Wert der Distanzdifferenz 0.4300.

| Platte | Gewicht |                                         |  |  |  | $v$      | $pvv$      |
|--------|---------|-----------------------------------------|--|--|--|----------|------------|
| 40     | 1.0     | $1.00 x - 2.33 y + 1.69 \pi + 2.14 = 0$ |  |  |  | $+ 0.65$ | 0.42       |
| 42     | 0.5     | $- 2.28 + 1.92 + 1.32$                  |  |  |  | $- 0.12$ | 0.01       |
| 48     | 0.1     | $- 2.27 + 1.95 - 1.52$                  |  |  |  | $- 2.95$ | 0.87       |
| 100    | 0.1     | $- 0.30 + 1.84 + 3.45$                  |  |  |  | $+ 3.06$ | 0.94       |
| 103    | 1.0     | $- 0.24 + 1.99 - 0.75$                  |  |  |  | $- 1.09$ | 1.19       |
| 105    | 0.5     | $- 0.17 + 1.78 + 0.08$                  |  |  |  | $- 0.25$ | 0.03       |
| 107    | 1.0     | $- 0.17 + 1.78 + 0.25$                  |  |  |  | $- 0.08$ | 0.01       |
| 110    | 1.0     | $+ 0.25 - 1.99 + 0.75$                  |  |  |  | $+ 0.21$ | 0.04       |
| 111    | 0.5     | $+ 0.25 - 1.99 + 1.12$                  |  |  |  | $+ 0.58$ | 0.17       |
| 113    | 1.0     | $+ 0.34 - 1.74 - 0.91$                  |  |  |  | $- 1.37$ | 1.88       |
| 114    | 2.0     | $+ 0.34 - 1.74 + 0.08$                  |  |  |  | $- 0.38$ | 0.29       |
| 117    | 2.0     | $+ 0.40 - 1.22 + 0.82$                  |  |  |  | $+ 0.45$ | 0.40       |
| 119    | 2.0     | $+ 0.43 - 0.95 + 0.77$                  |  |  |  | $+ 0.45$ | 0.40       |
| 121    | 1.0     | $+ 0.72 + 1.92 + 0.16$                  |  |  |  | $+ 0.32$ | 0.10       |
| 123    | 1.0     | $+ 0.72 + 1.92 - 0.04$                  |  |  |  | $+ 0.12$ | 0.01       |
|        |         |                                         |  |  |  |          | <hr/> 6.75 |

$$\begin{aligned} \text{Normalgleichungen: } & + 14.70 x + 0.27 y - 1.02 \pi + 6.39 = 0 \\ & + 10.84 y - 9.12 \pi - 4.63 = 0 \\ & + 41.32 \pi - 0.29 = 0 \end{aligned}$$

In Scalateilen (2. Decimalstelle)

$$\pi = + 0.114$$

$$y = + 0.533$$

$$x = - 0.436$$

In Bogensecunden

$$\pi = + 0''.068 \pm 0''.078$$

$$y = + 0.320 \pm 0.151$$

Mittlerer Fehler einer Gleichung Gewicht 1 0''.450.

Bedingungsgleichungen. Paar 3—4.

Angenommener Wert der Distanzdifferenz 0.1300.

| Platte | Gewicht |                                         |  |  |  | $v$      | $pvv$      |
|--------|---------|-----------------------------------------|--|--|--|----------|------------|
| 48     | 0.1     | $1.00 x - 2.27 y + 1.95 \pi - 1.94 = 0$ |  |  |  | $+ 0.17$ | 0.00       |
| 100    | 0.1     | $- 0.30 + 1.84 + 3.56$                  |  |  |  | $+ 4.31$ | 1.86       |
| 103    | 1.0     | $- 2.24 + 1.99 - 1.94$                  |  |  |  | $- 1.20$ | 1.44       |
| 107    | 1.0     | $- 0.17 + 1.77 + 0.10$                  |  |  |  | $+ 0.75$ | 0.56       |
| 110    | 1.0     | $+ 0.25 - 1.99 + 0.44$                  |  |  |  | $- 0.01$ | 0.00       |
| 111    | 0.5     | $+ 0.25 - 1.99 + 0.24$                  |  |  |  | $- 0.21$ | 0.02       |
| 113    | 1.0     | $+ 0.34 - 1.73 - 1.00$                  |  |  |  | $- 1.45$ | 2.10       |
| 114    | 2.0     | $+ 0.34 - 1.73 + 0.40$                  |  |  |  | $- 0.05$ | 0.00       |
| 117    | 2.0     | $+ 0.40 - 1.21 + 1.15$                  |  |  |  | $+ 0.77$ | 1.19       |
| 119    | 2.0     | $+ 0.43 - 0.93 + 0.54$                  |  |  |  | $+ 0.20$ | 0.08       |
| 123    | 1.0     | $+ 0.72 + 1.92 - 0.34$                  |  |  |  | $- 0.24$ | 0.06       |
|        |         |                                         |  |  |  |          | <hr/> 7.31 |

$$\begin{aligned} \text{Normalgleichungen: } & + 11.70 x + 3.10 y - 6.40 \pi + 1.73 = 0 \\ & + 2.26 y - 4.20 \pi + 1.98 = 0 \\ & + 30.98 \pi - 8.59 = 0 \end{aligned}$$

In Scalateilen (2. Decimalstelle)

$$\pi = + 0.216$$

$$y = - 0.680$$

$$x = + 0.150$$

In Bogensecunden

$$\pi = + 0''.130 \pm 0''.098$$

$$y = - 0.408 \pm 0.427$$

Mittlerer Fehler einer Gleichung Gewicht 1 0''.47.

Tafel X.

Bedingungsgleichungen. Paar 5—6.

Angenommener Wert der Distanzdifferenz 0.6300.

| Platte | Gewicht |                                      | $v$     | $pvv$ |
|--------|---------|--------------------------------------|---------|-------|
| 40     | 1.0     | $1.00x - 2.33y + 1.67\pi + 3.06 = 0$ | $+1.09$ | 1.19  |
| 42     | 0.5     | $-2.28 + 1.92 + 1.36$                | $-0.50$ | 0.12  |
| 48     | 0.1     | $-2.27 + 1.95 - 1.39$                | $-3.23$ | 1.04  |
| 100    | 0.1     | $-0.30 + 1.83 + 3.86$                | $+3.58$ | 1.28  |
| 103    | 1.0     | $-0.24 + 1.99 - 0.93$                | $-1.11$ | 1.23  |
| 105    | 0.5     | $-0.17 + 1.80 - 0.61$                | $-0.80$ | 0.32  |
| 107    | 1.0     | $-0.17 + 1.80 - 0.33$                | $-0.52$ | 0.27  |
| 110    | 1.0     | $+0.25 - 2.00 - 0.09$                | $-1.06$ | 1.12  |
| 111    | 0.5     | $+0.25 - 2.00 + 0.41$                | $-0.56$ | 0.16  |
| 113    | 1.0     | $+0.34 - 1.76 + 1.01$                | $+0.18$ | 0.03  |
| 114    | 2.0     | $+0.34 - 1.76 + 0.50$                | $-0.33$ | 0.22  |
| 117    | 2.0     | $+0.40 - 1.25 + 1.40$                | $+0.77$ | 1.19  |
| 119    | 2.0     | $+0.43 - 0.98 + 0.82$                | $+0.30$ | 0.18  |
| 121    | 1.0     | $+0.72 + 1.92 + 0.52$                | $+1.08$ | 1.19  |
| 123    | 1.0     | $+0.72 + 1.92 - 0.87$                | $-0.31$ | 0.10  |
|        |         |                                      |         | 9.64  |

$$\begin{aligned} \text{Normalgleichungen: } & +14.70x + 0.27y - 1.20\pi + 8.64 = 0 \\ & +10.83y - 9.14\pi - 5.87 = 0 \\ & +41.88\pi - 5.68 = 0 \end{aligned}$$

In Scalateilen (2. Decimalstelle)

$$\pi = +0.294$$

$$y = +0.805$$

$$x = -0.579$$

In Bogenseconds

$$\pi = +0''.176 \pm 0''.092$$

$$y = +0.483 \pm 0.179$$

Mittlerer Fehler einer Gleichung Gewicht 1 0''.54.

Bedingungsgleichungen. Paar 7—8.

Angenommener Wert der Distanzdifferenz 0.0600.

| Platte | Gewicht |                                      | $v$     | $pvv$ |
|--------|---------|--------------------------------------|---------|-------|
| 40     | 1.0     | $1.00x - 2.33y + 1.75\pi + 0.83 = 0$ | $+0.12$ | 0.01  |
| 42     | 0.5     | $-2.28 + 1.57 + 1.11$                | $+0.39$ | 0.08  |
| 48     | 0.1     | $-2.27 + 1.49 - 0.21$                | $-0.95$ | 0.09  |
| 100    | 0.1     | $-0.30 + 1.67 + 2.34$                | $+2.27$ | 0.52  |
| 103    | 1.0     | $-0.24 + 1.29 - 0.89$                | $-1.00$ | 1.00  |
| 105    | 0.5     | $-0.17 + 0.61 - 0.30$                | $-0.49$ | 0.12  |
| 107    | 1.0     | $-0.17 + 0.61 + 0.37$                | $+0.18$ | 0.03  |
| 110    | 1.0     | $+0.25 - 1.30 + 0.41$                | $+0.06$ | 0.00  |
| 111    | 0.5     | $+0.25 - 1.30 + 1.18$                | $+0.83$ | 0.34  |
| 113    | 1.0     | $+0.34 - 0.49 - 1.09$                | $-1.29$ | 1.66  |
| 114    | 2.0     | $+0.34 - 0.49 + 0.28$                | $+0.08$ | 0.01  |
| 117    | 2.0     | $+0.40 + 0.20 + 0.39$                | $+0.32$ | 0.20  |
| 119    | 2.0     | $+0.43 + 0.50 + 0.25$                | $+0.24$ | 0.11  |
| 121    | 1.0     | $+0.72 + 1.56 + 0.00$                | $+0.24$ | 0.06  |
| 123    | 1.0     | $+0.72 + 1.56 - 0.33$                | $-0.09$ | 0.01  |
|        |         |                                      |         | 4.22  |

$$\begin{aligned} \text{Normalgleichungen: } & +14.70x + 0.27y + 6.14\pi + 2.35 = 0 \\ & +10.80y - 4.87\pi - 2.67 = 0 \\ & +15.70\pi + 0.53 = 0 \end{aligned}$$

In Scalateilen (2. Decimalstelle)

$$\pi = +0.157$$

$$y = +0.323$$

$$x = -0.232$$

In Bogenseconds

$$\pi = +0''.094 \pm 0''.108$$

$$y = +0.194 \pm 0.124$$

Mittlerer Fehler einer Gleichung Gewicht 1 0''.356.

Tafel X.

Bedingungsgleichungen. Paar 9—10.

Angenommener Wert der Distanzdifferenz 0.0900.

| Platte | Gewicht |                                         |  |  | $v$    | $pvv$ |
|--------|---------|-----------------------------------------|--|--|--------|-------|
| 40     | 1.0     | $1.00 x - 2.33 y - 0.29 \pi + 0.50 = 0$ |  |  | + 0.24 | 0.06  |
| 42     | 0.5     | — 2.28 — 0.78 + 0.38                    |  |  | + 0.00 | 0.00  |
| 48     | 0.1     | — 2.27 — 0.92 + 2.42                    |  |  | + 2.00 | 0.40  |
| 100    | 0.1     | — 0.30 — 0.58 — 0.08                    |  |  | — 0.61 | 0.04  |
| 103    | 1.0     | — 0.24 — 1.18 + 0.36                    |  |  | — 0.33 | 0.11  |
| 105    | 0.5     | — 0.17 — 1.66 — 1.28                    |  |  | — 2.08 | 2.16  |
| 107    | 1.0     | — 0.17 — 1.66 + 1.10                    |  |  | + 0.30 | 0.09  |
| 110    | 1.0     | + 0.25 + 1.16 — 0.87                    |  |  | — 1.03 | 1.06  |
| 111    | 0.5     | + 0.25 + 1.16 + 0.93                    |  |  | + 0.77 | 0.30  |
| 113    | 1.0     | + 0.34 + 1.72 — 2.34                    |  |  | — 2.37 | 5.61  |
| 114    | 2.0     | + 0.34 + 1.72 + 0.90                    |  |  | + 0.87 | 1.51  |
| 117    | 2.0     | + 0.40 + 1.82 + 0.71                    |  |  | + 0.69 | 0.95  |
| 119    | 2.0     | + 0.43 + 1.77 — 0.28                    |  |  | — 0.31 | 0.19  |
| 121    | 1.0     | + 0.72 — 0.79 + 0.95                    |  |  | + 0.27 | 0.07  |
| 123    | 1.0     | + 0.72 — 0.79 + 1.66                    |  |  | + 0.98 | 0.96  |
|        |         |                                         |  |  |        | 13.51 |

$$\begin{aligned} \text{Normalgleichungen: } & + 14.70 x + 0.27 y + 8.00 \pi + 4.26 = 0 \\ & + 10.82 y + 6.51 \pi - 0.41 = 0 \\ & + 31.06 \pi - 3.56 = 0 \end{aligned}$$

In Scalateilen (2. Decimalstelle)

$$\begin{aligned} \pi &= + 0.244 \\ y &= - 0.099 \\ x &= - 0.421 \end{aligned}$$

In Bogensekunden

$$\begin{aligned} \pi &= + 0''146 \pm 0''133 \\ y &= - 0.059 \pm 0.234 \end{aligned}$$

Mittlerer Fehler einer Gleichung Gewicht 1 0<sup>6</sup>36.

Bedingungsgleichungen. Paar 11—12.

Angenommener Wert der Distanzdifferenz 0.0400.

| Platte | Gewicht |                                         |  |  | $v$    | $pvv$ |
|--------|---------|-----------------------------------------|--|--|--------|-------|
| 40     | 1.0     | $1.00 x - 2.33 y + 0.30 \pi + 0.10 = 0$ |  |  | — 0.83 | 0.69  |
| 42     | 0.5     | — 2.28 + 0.80 + 2.68                    |  |  | + 1.80 | 1.62  |
| 48     | 0.1     | — 2.27 + 0.94 — 2.21                    |  |  | — 3.07 | 0.94  |
| 100    | 0.1     | — 0.30 + 0.60 + 0.70                    |  |  | — 0.07 | 0.00  |
| 103    | 1.0     | — 0.24 + 1.20 + 0.85                    |  |  | + 0.15 | 0.02  |
| 105    | 0.5     | — 0.17 + 1.67 + 2.43                    |  |  | + 1.79 | 1.62  |
| 107    | 1.0     | — 0.17 + 1.67 + 0.09                    |  |  | — 0.55 | 0.30  |
| 110    | 1.0     | + 0.25 — 1.18 + 1.76                    |  |  | + 0.84 | 0.71  |
| 111    | 0.5     | + 0.25 — 1.18 + 0.24                    |  |  | — 0.68 | 0.23  |
| 113    | 1.0     | + 0.34 — 1.75 + 2.27                    |  |  | + 1.29 | 1.66  |
| 114    | 2.0     | + 0.34 — 1.75 + 0.90                    |  |  | — 0.08 | 0.01  |
| 117    | 2.0     | + 0.40 — 1.84 + 0.58                    |  |  | — 0.40 | 0.32  |
| 119    | 2.0     | + 0.43 — 1.78 + 0.76                    |  |  | — 0.21 | 0.08  |
| 121    | 1.0     | + 0.72 + 0.81 + 1.68                    |  |  | + 1.01 | 1.02  |
| 123    | 1.0     | + 0.72 + 0.81 — 1.00                    |  |  | — 1.67 | 2.79  |
|        |         |                                         |  |  |        | 11.99 |

$$\begin{aligned} \text{Normalgleichungen: } & + 14.70 x + 0.27 y - 8.08 \pi + 12.76 = 0 \\ & + 10.80 y - 6.63 \pi + 0.21 = 0 \\ & + 31.85 \pi - 9.50 = 0 \end{aligned}$$

In Scalateilen (2. Decimalstelle)

$$\begin{aligned} \pi &= + 0.106 \\ y &= + 0.065 \\ x &= - 0.811 \end{aligned}$$

In Bogensekunden

$$\begin{aligned} \pi &= + 0''064 \pm 0''124 \\ y &= + 0.039 \pm 0.197 \end{aligned}$$

Mittlerer Fehler einer Gleichung Gewicht 1 0<sup>6</sup>60.

Tafel X.

Bedingungsgleichungen. Paar 13—14.

Angenommener Wert der Distanzdifferenz 2.1000.

| Platte | Gewicht |                                      | $v$      | $pvv$ |
|--------|---------|--------------------------------------|----------|-------|
| 40     | 1.0     | $1.00x - 2.33y + 1.71\pi + 0.56 = 0$ | $+ 0.58$ | 0.34  |
| 42     | 0.5     | $- 2.28 + 1.52 - 1.72$               | $- 1.72$ | 1.48  |
| 48     | 0.1     | $- 2.27 + 1.44 + 0.80$               | $+ 0.80$ | 0.06  |
| 100    | 0.1     | $- 0.30 + 1.53 + 2.32$               | $+ 2.12$ | 0.45  |
| 103    | 1.0     | $- 0.24 + 1.23 + 0.34$               | $+ 0.12$ | 0.01  |
| 105    | 0.5     | $- 0.17 + 0.54 - 0.02$               | $- 0.28$ | 0.04  |
| 107    | 1.0     | $- 0.17 + 0.54 + 0.44$               | $+ 0.18$ | 0.03  |
| 110    | 1.0     | $+ 0.25 - 1.26 + 0.02$               | $- 0.38$ | 0.14  |
| 111    | 0.5     | $+ 0.25 - 1.26 + 1.00$               | $+ 0.60$ | 0.18  |
| 113    | 1.0     | $+ 0.34 - 0.42 - 1.34$               | $- 1.71$ | 2.92  |
| 114    | 2.0     | $+ 0.34 - 0.42 + 0.56$               | $+ 0.19$ | 0.07  |
| 117    | 2.0     | $+ 0.40 + 0.27 + 0.96$               | $+ 0.62$ | 0.79  |
| 119    | 2.0     | $+ 0.43 + 0.56 + 1.01$               | $+ 0.68$ | 0.92  |
| 121    | 1.0     | $+ 0.72 + 1.52 - 0.09$               | $- 0.41$ | 0.17  |
| 123    | 1.0     | $+ 0.72 + 1.52 - 0.60$               | $- 0.92$ | 0.85  |
|        |         |                                      |          | 8.45  |

Normalgleichungen:  $+ 14.70x + 0.27y + 6.36\pi + 4.33 = 0$   
 $+ 10.80y - 4.56\pi + 1.45 = 0$   
 $+ 14.77\pi + 0.80 = 0$

In Scalateilen (2. Decimalstelle)

$\pi = + 0.0479$   
 $y = - 0.106$   
 $x = - 0.313$

In Bogensecunden

$\pi = + 0^{\circ}029 \pm 0^{\circ}159$   
 $y = - 0.064 \pm 0.168$

Mittlerer Fehler einer Gleichung Gewicht 1 0<sup>u</sup>503.

Beobachtungsgleichungen. Paar 15—16.

Angenommener Wert der Distanzdifferenz 1.0000.

| Platte | Gewicht |                                      | $v$      | $pvv$ |
|--------|---------|--------------------------------------|----------|-------|
| 40     | 1.0     | $1.00x - 2.33y + 0.84\pi - 1.03 = 0$ | $- 0.65$ | 0.42  |
| 42     | 0.5     | $- 2.28 + 0.40 - 0.03$               | $+ 0.31$ | 0.05  |
| 48     | 0.1     | $- 2.27 + 0.26 + 1.95$               | $+ 2.27$ | 0.52  |
| 100    | 0.1     | $- 0.30 + 0.61 + 0.25$               | $+ 0.76$ | 0.06  |
| 103    | 1.0     | $- 0.24 - 0.04 - 0.05$               | $+ 0.40$ | 0.16  |
| 105    | 0.5     | $- 0.17 - 0.77 - 1.24$               | $- 0.86$ | 0.37  |
| 107    | 1.0     | $- 0.17 - 0.77 + 0.26$               | $+ 0.64$ | 0.41  |
| 110    | 1.0     | $+ 0.25 + 0.01 - 0.31$               | $+ 0.18$ | 0.03  |
| 111    | 0.5     | $+ 0.25 + 0.01 + 1.04$               | $+ 1.53$ | 1.17  |
| 113    | 1.0     | $+ 0.34 + 0.89 - 2.00$               | $- 1.41$ | 1.99  |
| 114    | 2.0     | $+ 0.34 + 0.89 - 1.06$               | $- 0.47$ | 0.44  |
| 117    | 2.0     | $+ 0.40 + 1.37 - 0.14$               | $+ 0.50$ | 0.50  |
| 119    | 2.0     | $+ 0.43 + 1.51 - 0.08$               | $+ 0.57$ | 0.65  |
| 121    | 1.0     | $+ 0.72 + 0.39 - 0.71$               | $- 0.15$ | 0.02  |
| 123    | 1.0     | $+ 0.72 + 0.39 - 1.55$               | $- 0.99$ | 0.98  |
|        |         |                                      |          | 7.77  |

Normalgleichungen:  $+ 14.70x + 0.27y + 9.17\pi - 7.85 = 0$   
 $+ 10.80y + 1.56\pi - 1.10 = 0$   
 $+ 12.70\pi - 5.69 = 0$

In Scalateilen (2. Decimalstelle)

$\pi = + 0.0914$   
 $y = + 0.076$   
 $x = 0.472$

In Bogensecunden

$\pi = + 0^{\circ}059 \pm 0^{\circ}186$   
 $y = + 0.046 \pm 0.146$

Mittlerer Fehler einer Gleichung Gewicht 1 0<sup>u</sup>484.



